



BIBLIOTECA NAZ.


Vittorio Emanuele III

XXX

A

22











# DE FEBRIBVS LIBELLVS.

EX VARIIS AVTHORI-  
bus collectus.

*Per Ioannem Ferrandum Iuniorem  
Medicum Regium.*

Ad illustrissimum Principem Hen-  
ricum Borbonium, Franciæ Pa-  
rem, Montis Penferij Ducem.




PARISIIS,

Apud MICHAËLEM SONNIUM, via  
Iacobæa sub signo scuti Basiliensis.

---

M. D. CII.





ILLVSTRISSIMO  
PRINCIPI HENRI-  
co Borbonio Franciæ  
Pari, montis Penferij  
Duci.

*Michaël Ferrādus in Castello-  
rotiano foro causarum pri-  
uatarum legatus. S. P. D.*

**D**abis mihi veniam  
Princeps Illustris-  
sime, si te rebus  
feriis occupatū interpello:  
faciam id paucis, exemplo  
Neoptolemi illius Enniani,

A ij

— *Ne in publica commoda  
peccem,  
Si longo sermone morer tua  
tempora.*

Cùm Ioannes Ferrandus  
pater meus Elleonoræ Fran-  
corum Reginae Christia-  
nissimæ medicinam nō in-  
foeliciter fecisset, ab illu-  
strissimo auo tuo Ludoui-  
co ad sanitatis suæ conser-  
uationem amplissimis præ-  
miis est euocatus. Huic pro-  
uincię, velut hereditario iu-  
re, successit frater natus ma-  
ior Iohannes Ferrandus,  
quem illustrissimi Princi-  
pes Ludouicus auus, &  
Franciscus parens tuus va-

letudinis suæ arbitrum delegerunt, in honore habuerunt, & in medicorum regionum album referendum curauerunt. Ille illustrissimorum Principum beneficio aliquod otium nactus, id omne ad scribendum conferebat. Scripsit autem multa ex variis authoribus collecta de multis medicinæ partibus. Ex his omnibus hunc de febribus librum selegi, quæ ad tua genua submissè prouolutus iure tibi debitum offero, ut vernam domi tuæ natum, & educatum. Quod eò libentius facio, quò magis desidero ex-

tare aliquod testimonium  
meæ in te obseruatię: valdè  
enim cupio illustrissimæ  
domus tuæ clietēlam à pa-  
rente meo , & fratre natu  
maiore veluti per man<sup>9</sup> mi-  
hi traditam perpetuò cole-  
re, & tāquam charissimam,  
honorificentissimāmq; cō-  
seruare, eāmq; adheredes  
meos transmittere. Itaque  
me in tuā fide , & clien-  
telā perpetuò futurum pro-  
fiteor : & me , meāsque  
fortunas, & liberos tibi de-  
uoueo. Idē pro fratre meo  
Antonio Ferrando in Pari-  
fienfi foro minore actionū  
ciuiliū & capitalium iudice



sublegato promitto, spon-  
deóq; . Ille ob eã rē se nexu  
tibi obligabit , fidēq; à me  
datam seriò liberabit. Vale,  
Regij sanguinis flos illiba-  
te , & nobis , Ferrandísque  
omnibus, nō solùm vt mǎ-  
cipio nexúque propriis,  
sed vt vsu fructúque tuis  
utere. Castellorotiani Pri-  
die kal. Nouemb. anno à  
Salut. restit. 1601.

A iij



MICHAEL SON-

N I V S.

Lectori S.

**I**ohannes Ferrandus  
iunior Regum Chri-  
stianissimorum &  
illustrissimorum Principum  
Montis Penserij ducum  
Medicus ex variis autho-  
ribus multa collegit, ad plu-  
res medicinae partes pertinen-  
tia, quæ in ordinem redigere,  
& in lumē edere parabat, cū  
mors illius immatura tam lau-  
dabile consilium anteuertit.  
Hæc in situ & puluere neglecta  
iacebāt, propediem interitura,

5  
nisi Michaël Ferrādus defun-  
cti frater in foro Castelloro-  
tiano rerum privatarum lega-  
tus Iudex æquissimus à perpe-  
tuâ nocte hæc vindicasset.

Ex omnibus hunc breuissi-  
mum de febribus libellum se-  
legit, quem excudendum cu-  
rauit, ut, si ex eo aliquid com-  
modi te percepisse intelligat,  
reliqua opera, quæ multa sunt,  
in publicū emittat. Hic nullis  
sūptib<sup>9</sup> pepercit, ut tuis studiis  
consuleret : Antonius autem  
Ferrandus in minore foro Pa-  
risiensi civilium & capitalium  
actionum sublegatus Iudex  
integerimus in his ex pulvere  
educendis, & in lucem edendis

magnam curam adhibuit. Tres  
illi fratres tam sedulò viden-  
tur in tua commoda conspira-  
uisse, ut Ioannes natu maior  
etatem suam, Michaël pecu-  
niam, Antonius summam cu-  
ram, operam, & diligentiam  
in tuis studijs promouēdis col-  
locauerint. Quare si ex his fru-  
ctū aliquē retuleris, Ferrandis  
gratias agito: sin minus, illo-  
rum tamen liberalitatem, &  
propensam in te voluntatem  
cādide amplectitor. Vale, Le-  
ctor, & Ferrandis omnibúsq;  
utilitatis publicæ studiosis be-  
nè precare. Lutetiae Jdi. No-  
uemb. Anno 1601.



DE FEBRIBVS LI-  
BELLVS, EX VARIIS  
auctoribus collectus.

*Per Ioannem Ferrandum Iu-  
niorem Medicum Regium.*



ALOR præter na- Ex Fer-  
nel.ca.1.  
lib.4.  
pathol.  
turam aduersatur  
naturali. Est autem  
naturalis duplex,  
vnus insitus in so-  
lidarum partium humido pri-  
migenio inhærescens, cuius  
est origo cælestis: Alter ele-  
mentaris, moderatus, & ex  
omnium elementorum per-  
mixtione temperatus. Ille om-

nium functionum primarius est opifex: hic verò adiuuans, quòd elementorũ temperies insitum illum calorem foueat excitetque. Insitum olim demonstraui-  
 mus exuperare non posse, nec illius copiã & vbertatem vitio vnquam dari, sed quò fuerit vberior (vt in infãtium ætate) cò naturales vitæ functiones reddi feliciores. In eo igitur consistere febris nulla potest: sed febris essentia calor est præter naturam, quæ, cùm adest, tanquam hostis insensus, insiti illius substantiam semper oppugnat, labefactat, omnesque functiones interpellat. Triplex autem cõstitui debet, vnus admodum simplex, qui solius est caloris exuperantia, hinc genitus, quòd calor elementaris assi-

duo incremento de temperie  
& mediocritate decedens plus  
nimio exuperat, &, qui natu-  
ralis fuerat, sensim non natu-  
ralis euasit, vitiosus proinde  
& naturæ iam infensus. Alter  
est calor ex putrescente mate-  
riâ prognatus, qui etiam si non  
admodum sit ardēs, quoniam,  
tamen eius, de quâ prodit, ma-  
teriæ conditionem redolet,  
præter naturam est, & insito  
calori grauis. Tertius est mali-  
gnus & perniciosus, quem pe-  
stilens, venenataque materia  
fundit non qualitatis exupe-  
rantia, non putredine, sed to-  
tius substantiæ diffidio, vitali  
insitoq; calori aduersus. Solus  
igitur, qui præter naturā est, ca-  
lor, febris existit, si modò iam  
accensus cōstānsq; permanet. *Fernel.*  
Non est id perpetuū, q̄ definit. *Ibidem.*

DE FEBRIBVS

Auicēnas, omnis febris calorem in corde accendi. Tamen si de continuis & primariis id verum fatemur, intermittentium tamen & Symptomaticarum calor non in corde primum accenditur, sed aliunde sublatus cor ferit, è quo æstuās cum spiritu mox per arterias in corpus omne refunditur.

*Febrim  
signa cō  
munia.*

Omniū porrò febrium communes notæ sunt, pulsus celer ac frequens, interdum etiam inæqualis, qui solius calidioris cordis est proprius. Virium lāguor & imbecillitas cum spontaneâ corporis grauitate ac dissolutione: corpus quippe vniuersum consentit laboranti cordi. Calor aut foris acer ac pungens, aut intus certè molestus, qui & nō nunquam feruido halitu prorūpit è naribus.

*Vt tota*





*De Ephemera febre.*

Febris Ephemera est calor *Ex Fer-*  
 præter naturam in spiritu pri- *nelio ca.*  
 mum cõfidens. Est autem hic *3. lib. 1.*  
 spiritus non insitus, quem in *Patho-*  
*log.*  
 Physiologiâ diximus solidâ  
 parte contineri, eiûsque præ-  
 cipuam substantiam comple-  
 re: sed arteriarum communis  
 è corde in omne corpus in-  
 fluens & illapsus: hic Epheme-  
 ræ materia est continensque  
 causa, vt in quo, tâquam basi,  
 consistens, in reliquum dein  
 corpus innadit, eiûsque fun-  
 ctiones interpellat. Atque vt  
 spiritus admodum tenuis est,  
 ita, & quæ in eo consistit fe-  
 bris, omnium est leuissima &  
 facilè dissipabilis, non cõstans,  
 sed veluti transiens ac præter-  
 fluens. Huic ferè origo est à  
 causis euidentibus, quarum vi

C

*Febrem  
omnem  
putandā  
ab eide  
tibus cau  
sis excita  
tam ne-  
cessario  
præcepsit  
diaria.  
Epheme  
ra signa.*

& impulsu tenuis, calidus, feruidusq; spiritus, omnium, quæ in corpore sunt promptissimè incenditur. Cùm igitur ab his non prius humores, quàm spiritus, inflammari possint, necesse est febrē omnē putridā ab his genitam quædam antecedit Ephemera. Huius notæ sunt, quòd non sensim præcedente cibi fastidio, aut spontaneâ corporis lassitudine, aut grauiore somno, & frequenti oscitatione, sed tota repentèprehendit, solâq; euentium causarum vi infertur, aut nullus aut admodum leuis horror initio fatigat, idque dumtaxat, cùm cacochymum corpus expirationem multam, eamq; calidam & acrem diffundit, quæ ob cutem à frigore densatam, aut ob exiliū meatuum

constipationem supressa ferit partes neruofas. Multa comitantur sæua symptomata, nec vehemens dolor, nec magna corporis iactatio. Pulsus quidem celer & frequens, sed tamen æqualis & ordinatus, magnus ac validus, nisi vel ex mœrore, vel ex inedia, vel cruditate, vel frigore orta sit: est & in pulsu diastole maior atque velocior, quàm systole: inspiratio quoque expiratione & maior & celerior. Calor tactu mitis, suavis, atque halitu plenus, qui ferè eo ipso die aut totus occultè expiratur, aut in adore sudorèue naturali, eoque miti, nec graucolente discutitur.

Vrina substantiâ colore, sedimento, aut nihil, aut minimum *Ephes* à naturali distās. Febris diariæ *mere causæ* p̄gressæ euidētēsq; causæ sunt, *sic procatarica.*

# DE FEBRIBVS

quæcūque calidiorem intemperiem inferunt: Solis æstus, omnisque ambientis feruor, lassitudo, labórque vehemens: vigiliæ, inediæ, intenta animi contentio, ex ira, curis, tristitia, vel timore. Omniū autem grauissimæ sunt, cruditas, siue ex nimia cibi copia, & helleuatione, siue ex vino meracioris, siue ex fructuū corruptorumque ciborum esu contracta &c.

*Ephemeræ curatio ex Gal. lib. 1. de arde curandi ad Glauconem.* Hæ febres ex lassitudine nascuntur, temulentiâ, irâ, mero-re, excandescencia, furore, aliisque vehementibus animi curis. In hoc genere cōtinentur & quæ à bubone originem ducunt: exceptis iis, quæ sine manifesto fiūt vlcere: hæ enim suspicione non vacant, minimæque mites sunt. Sed & per;

uigilium simplicem febrē sæpe attulit, quemadmodum & algor, nonnumquā & ardor. Omnes hæ febres solui facili-  
mè possunt, siquidem ad bal-  
meas, aliamque vsitatam vi-  
uendi rationem, ægrotum sta-  
tim ducere oportet. Itaq; qui  
multorum fermone celebra-  
tam illam diatrion i. tridua-  
nam inediam, in omnibus iis  
admittunt, febres reddunt fe-  
rè acriores: tametsi etiam alio-  
qui delinquant, quēadmodum  
ex ipsis videre est non paucos,  
qui quoties ægrotos inuisunt,  
ita aberrant, vt certè manu fa-  
ctas ægritudines inducāt. Ha-  
rum igitur febrium prompta  
est curatio, sed diligentiam  
exigit maiorem dignotio.

*De Syncho febre ex Fernel. cap.  
4. lib. 4. Physiologiæ.*

## DE FEBRIBVS

Februm quæ in humoris  
 vitio positæ sunt, omnium pri-  
 ma est Synochos, nobis con-  
 tinens appellata. Ea assiduò  
 fatigat, nullâ excandescentiâ,  
 nullâque intermissione dum  
 integrè soluta sit. Est autem  
 duplex: vna sine putredine, al-  
 tera putrida. Vtriusque mate-  
 ria continensque causa in va-  
 sis est maioribus, inter alas ex  
 inguina sitis, atque ea est vtri-  
 que sedes. Materia autem san-  
 guis est, non ille quidem sim-  
 plex, sed q̄ ex quatuor humo-  
 rû æquabili permistione con-  
 stet. In eos proinde duntaxat  
 Synochus inuadit, qui tem-  
 perati aut aliquantò humidio-  
 res calidioresque sunt, ætate  
 media, & quos plethora, id est  
 sanguinis exuperantia, & æqua-  
 bilis succorum redundantia

premit, cæterasque naturas constitutionesque non attingit. Eaque causa est cur admodum rarò Synochus reperitur simplex. Itaque sanguinis quædam velut efferuescentia & simplex inflammatio, quæ phlogosis appellatur, Synochus est sine putredine. De causis prægressis & signis vide reliquum caput.

*Curatio Synochi ex Rondel. Lib. de febr. cap. de Syno.*

Gal. duo esse præcipua remedia huius febris 9. Metho. scripsit; sanguinis missionem, & frigidæ potionem. Sed sanguinem mitti vult, si vires & ætas patiantur vsque ad animi deliquium. Si autem vires & ætas dissuadeant duabus cucurbitulis cum scarificatione humeris, aut naribus apposi-



tis, illam magnam sanguinis redundantiam auferri iubet, & huiusce rei causam reddit, quòd subito in contrarium habitum corpus trahat, nihilque iucundius ægris & naturæ esse possit.

Missio sanguinis ad syncope[m] materiam calidam, i. sanguinem & fumos calidos retentos subito euacuat, à quibus caliditas illa præter naturam excitata fuerat: & quia in locum sanguinis extracti venæ multum aëris fridigi fuga vacui extrahunt, à quo reliquus sanguis & venæ refrigerantur, & in naturalem habitum reducuntur, extinguuntur incendia, prohibetur putrefactio. Quod autem corpus refrigeretur ex magna sanguinis missione experientia manifestum est. Calor enim

enim tam naturalis, quàm præter naturam in sanguine & spiritu situs est: mutatur igitur in contrarium habitum. Nam habitus calidus in frigidiorẽ vertitur. Iucundum autem est & naturæ & ægris, quia leuantur maximâ abundantia sanguinis feruidi. Verùm quia periculosa est hæc subita mutatio, neque vires eorum satis perspectæ esse possunt, cū quibus antè non sumus versati, satius erit magnam sanguinis quantitatem non extrahere, & post vnam atque alteram horam, quod reliquum est, euacuare: eadem enim vtilitas sequitur. Præstaret aliquando minorem quantitatem trahere in primâ illâ euacuatione, quando satis certi non sumus de specie febris, aut eius ma-

gnitudine, aut cùm non licuit clysterem priùs iniicere, aut cùm æger aliqua cruditatis vestigia in ventriculo habet, aut quando æger formidat magnam euacuationem, aut qui ægro adstat. Non solùm in hac febre id faciendum, sed etiam in ea quæ à putredine sanguinis fit, trahitur sanguis vsque ad animi defectum, in vehementissimo dolore inflammationis, & in euidentissima febre vt Gal. iubet in lib. de experimento & comment. in aphorif. 23. lib. I. Factâ igitur sanguinis missione pro viribus ægrotantis, vel per venam basilicam dextri vel sinistri brachij, iniiciemus clysterem, si prius non licuerit. Clyster sit emolliens, & modicè refrigerans. Nam qui nimium refri-

gerant, constringunt potius, quàm laxant, & hoc commune præceptum fit in omnibus morbis, in quibus mittere sanguinem oportet, vt priùs iniiciatur clyster, vel paulò post missionem, vt recrementa intestinorum detergeantur, ne venæ inanitæ succum crudum vel corruptum ad sese trahant: & in quibus alius adstricta sit per aliquot dies, vt in his, quibus præcessit cibi corruptio vel cruditas, non solum utile est clysterem iniicere, sed vomitione vel cõuenienti medicamento id, quod in ventriculo est, & intestinis, euacuare oportet. Clyster hoc modo parabitur.

℞. maluæ, branca vrsinæ, violarum añ. m. i. fol. lactucae vel cucurbit. vel melonum

D ij

# DE FEBRIBVS

m.ß. prunorum paria iiii. semi-  
nis anisi zij. florum cordial.  
pug. i. furs. p. ij. fiat decoctio.  
in libra j. ß. dissol. mell. viol.  
Lohoc de Cass. añ. zij. olei  
viol. zij. fiat clyster.

Si alius sit valdè adstricta,  
& facultas sit sopita, irritanda  
erit zij. salis communis, aut  
sacci cicla. zij. Habet vim de-  
tergendi, & qualitate nitrosâ  
mouendi ventrem Si diues sit,  
loco Lohoc de Cass.

℞. Cass. cum sacch. zij. aut  
zij. Cath. vel zij. saccharum ru-  
brum ol. viola. & mel. viol. pō-  
nendum non rosatum pro-  
pter adstrictionem. Violæ re-  
frigerant simul & leniūt. Quo  
tempore non reperiuntur fo-  
lia cucurbitæ, & aliarū, ponen-  
tur quatuor semina frigida ma-  
iora ad maiorem refrigeratio-

nem: sed hoc magis in secūdis, tertiis, & quartis iniectionibus quàm in primâ. Sufficit in primo clystere lenire aluum, & non calefacere. Et quàmquam Galenus cōtētus sit suâ sanguinis missione ad syncopem, & potione aquæ frigidaë, nos in eiusmodi febre solemus caloris incendium extinguere syrupo, conditis, & aliis multis remediis. Syrupi autem dentur, qui habēt vim refrigerandi. Sed ex his alij id faciunt leniendo, alij constringendo, alij incidendo, alij incrassando. Itaque syruporum delectum facere oportet. Deligitur syrupus, qui egrotantis dispositionibus magis conuenit. Nam non omnes ægrotantes, neque vnus & idem æger eodem modo afficitur. Sūtenim,

# DE FEBRIBVS

quibus aliud liberiùs fluit , & illis Iulep Alexandrinus , & conserua rofarum , aut syrup. capill. vneris conueniunt, syrup. viol. syrup. de cucurbitâ non conueniunt, quia ventrem leniunt , neque his, qui bilem multam vomitione reiciunt , vt frequenter in hac febre accidere scribit Gal. 9. Methodi.

Qui autem sanguinem habent vitiatum facîle in febrem putridam incidunt : quod ne fiat, syropos putredini resistentes damus, vt syrup. de acetositate citri, delimonibus , de granatis , oxysaccharam simplicem. Hi namque omnes refrigerant & putredinem arcet. Quod si æger ad bilem propensior sit , aut multis recrementis abundet , syrupum de

Endiuia, de fumo terræ simplicem, quia serosa recrementa euacuat, damus. Istis syrups & aquis similibus, potiones matutinas paramus, quas improprie digestiuas dicim<sup>9</sup>: sunt enim alteratiuæ, & prohibentes putredinem manente substantia. Sunt quibus præstat sanguinem crassiores attenuare leuiter incidentibus, aut acidis syrups, qui refrigerando etiam incidunt. Sunt è contra qui sanguinem tenuissimum habent, quem incrassare refrigerando expedit, non tamen vsque adeò, vt fluxus sanguinis è naribus impediatur. Tracto sanguine, prima die, nullo præcedente clystere, vel minoratiuo, si cognoscamus morbum posse protrahi vsque ad septimum diem da-



mus medicamentum purgans ad serosa & biliosa recrementa euacuanda; quæ solent hanc febrē in putridam transmutare.

Sunt autem talia medicamenta, quæ citra calefactionē & humorum conturbationem aluum laxare possunt, Triphera persica, cath. infusio Rhab: in aquâ endiuivæ, decoctum pulpæ sebestem & tamarindorum, syrup. ros. laxatius, aut syrupus ex infusionibus multis violarum; Cass. cum semine berberis, aut aliis quæ acrimoniam eius extinguūt, aut prohibent transmutationem in bilem. Omnium istorum dosis est ab ℥j. ad ℥i℥. vel ℥ij. Cass. verò ab ℥j. ad 3. x. Rhei ad ℥i℥. Sufficit hæc quantitas, quia materia euacuanda

non multum distat ab intestinis.

Quod si Medicus, tertio demum die, vel quarto vocatus fuerit, id tentare non debet, sed potius naturæ comittere. Non tamen debet ( si vires ferant ) sanguinis missionem prætermittere, vt docet Galenus lib. de cur. ratio. per sang. missionem, & 9. Meth. in hunc modum scribens. Maxima verò continentium febrium remedia hæc duo sunt, sanguinis missio, & aquæ frigidæ potio. Verum illa nullo non tempore, modò vires sustineant: harum enim & in pulsu, & in urinis, & in concoctione evidentes cernuntur notæ, febris autem est maxima. Quod si in die critico signa coctionis manifesta præcesserint, notæ flu-

xionis sanguinis & sudoris iam appareant, silentium satius est habere, & naturæ totum negotium committere.

Quòd si nulla signa coctionis appareant, aut appareant futuræ criseos aliquæ notæ, satius etiam erit naturæ relinquere, quia moriturus est, & Hippocrates iubet morituros solis prognosticis relinquendos. Quod si nullæ notæ alicuius criseos siue bonæ siue malæ appareant, & morbus in dies augeatur, virésque ferre possint, sanguinem mittere oportet, in minori tamen quâtitate, quàm in primis diebus propter vires imbecilliores. Nam quicunque ab hac febre euaserunt, propter sanguinis missionem, vel propter sanguinis fluxum è naribus fa-

etum liberati sunt vt Gal. 9.  
meth. scriptum reliquit.

Quare non est prætermittendum illud certum, & tam præfens remedium, quod materiam simul & intemperiem aufert. Cæterum quæ Medicamenta diximus danda esse post sanguinis missionem, si cognoscamus morbum protrahi posse vsque ad septimum diem, qualia sunt Tryphera persica, ea inquam dilui debent vel in aqua vel in aquis, vel in decoctione. Multò enim facilius descendunt medicamēta liquida, & minus remorantur in ventriculo quàm si in forma solida assumantur, nisi æger propensus sit ad vomitum: tū satius erit dare in forma boli.

Decoctum autē magis lau-

D vj

# DE FEBRIBVS

dandum, quàm aquæ destilla-  
tæ : decoctione enim deter-  
minantur medicamēta vel ad  
humorem, vel ad tēperamen-  
tum: vt si quis daturus sit Rha-  
barbarum, quod vel calefacit,  
& constringit in hac sequenti  
decoctione datum minimè id  
efficiet. Nam in decocto, quæ  
possunt eius caliditatem ob-  
tūdere damus, vel quæ augēt,  
si quādo opus fuerit, vt exem-  
pli gratiâ hæc decoctio calidi-  
tatem etiam laxando minuet,  
obstructiones internas ape-  
riet, & ventrem leniet.

℞. prunorum , sebesten añ.  
paria quatuor seminum frigi-  
dorum maiorum contusorum  
ana ℥iij. anisi ℥j. Thamarindo-  
rum ℥j. florum trium cordia-  
lium añ. P. i. fiat decoctio in  
quartario vno col. diss. syrup.

viola. ʒj.

Hæc decoctio per se ventrem lenit, & acrimoniam sanguinis & bilis extinguit.

Quòd si maiori euacuatione opus fuerit syrup. rosarum laxatiuũ ad ʒij. ponemus. Quòd si diues sit, minuemus quantitatem syrup. laxat. & ʒj. Rhei infusi in decoctione vel aquã Endiuia imperabimus. Hæc omnia serosa recrementa & biliosa liquida euacuant. Potuissẽ addere in decoctione iniubas, sed illæ nimium incrassant. Satius enim est vel antè, ad humoris præparationem vel pòst, si humor nimia tenuitate peccauerit, decoctũ iniubarum & similium administrare, quia hic morbus est acutus, & extremos habet labores, statim tenuissimo victu.

## DE FEBRIBVS

vtendum est, ob id interdici-  
mus vsu vini, carnis & aliorum  
alimentorum, quæ multum  
sanguinis generant & corpus  
calfaciunt: ob id aquam pro  
vino damus, aut vinum malo-  
rum granatorum, aut iulepum  
Alexandrinum, pruna cocta,  
acida poma, præterea cocta.  
Concedimus cremorem hor-  
dei paratum ex paucó saccha-  
ro rosato, decoctū herbarum  
refrigerantium, vel lactucæ  
portulacæ. Denique victus ra-  
tio esto tenuissima. Quòd si vi-  
res vtcumque imbecilliores  
talem victus rationē ferre non  
possunt, decoctū pulli aut co-  
xæ capi vel gallinæ cum lactu-  
ca vel borragine, vel portula-  
câ, aut seminibus frigidis, si  
herbæ non reperiantur, con-  
cedimus.

Vti etiampotest lacte amygdalarum dulcium maceratarū in aquâ frigida & aqua ros. cum emulsione quatuor seminum frigid. maio. ne in bilem vertantur.

Quod si recentes essent, minùs verterentur in bilem. Est autem hoc lac dandum præcipuè his, qui dormire noctu nō possunt, vt caput repleat fumis & vaporibus. Conceduntur cucurbitulæ conditæ, lactucæ, stolones conditi saccharo, pyra condita, pauperibus etiam recentia cocta. Vinum dandum non est, nisi signa coctionis appareant, aut dolor capitis, aut deliriū prohibeat, nisi ad symptomatis mitigationem, vt ad syncopem. Et cū dandum erit, illud sit tenue album, dilutū multâ aqua.



Medicus proinde ex magnitudine & vehemètiâ morbi longitudinem poterit cognoscere, & viribus ægri exactè perpenſis cogitabit, num cum tali victu æger perdurare poſſit uſque ad ſtatum. Sed hoc ſemper in memoriâ habeat, morbos eſſe eò breuioreſ, quò acutiores, diuturnioreſ verò, quò mitioreſ, & quò minus celeriter mouentur, minùſque grauiſymptomata habent ob id victus rationẽ inſtituet conuenientem morbo, ætati, & conſuetudini.

Et quoniâ huius febris præſtantiffima remedia duo eſſe ſuperiùſ diximus, ſcilicet ſanguinis miſſionem & frigidaẽ potionem, hic nonnulla de huius uſu dicendũ, cùm & ad victus rationem pertinet, de

illa verò superiùs fatis diximus.

Docebimur igitur quænam aqua, qualis, quanta, & quomodo danda sit, & propter quam causam detur, & quibus danda non sit. Sunt enim nostro tempore Medici quidam pscrophoboi r. frigida exhibendæ formidantes, quòd putent omnes aquâ frigidâ lædi. Datur autē frigida dulcis, quæ prorsus sit gelida, & quantum ægro bibere licet, postquàm coctionis signa manifesta apparuerint in vrinis, & febris est remissio, non alio tempore. Danda non est his, qui crassos & lentos humores habēt, qui obstructions, qui phlegmonem, aut Erysipelas, aut scirrhum, aut œdema in visceribus, habent. Item qui gulam

& ventriculum, aut neruorum genus debilia habent, his frigida non est offerenda, sed his tantum, qui febre laborant ob cutis obstructions, & putredinem sanguinis in omnibus venis, saltem maioribus. Cum ergo coctionis humorum in his notas videris, audacter frigidam dabis: quippe solidarum animalis partium natura roborata, pertenuatos iam humores aggreditur, ita vt qui vtilis sint, ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat, inutiles vero per ventrem & cutim deiciat. Quod si etiam frigida assuetus fuerit, magna cum fiducia frigidam exhibebis, scilicet experientia iam edoctus, omnia viscera eius occursum familiariter tolerare.

Nonnulli qui potui frigida

non sunt assueti, propter fe-  
brem ardētem bibere coacti,  
nullum incommodum sense-  
runt, multò profectò minùs  
eorum, qui assueuerunt quif-  
quam lædi debet, etiam quasi  
ex epimetrou, & auctarij vice  
ipsa caloris copia accedit. Læ-  
dūtur autem aqua frigida, qui  
parum sanguinis & parum car-  
nis habent, quia celeriter ad  
solidas animalis partes perue-  
nit, nulli, quod eius vim fran-  
gat, occurrens. Eo etiam fit, vt  
hecticæ febres nec multam  
desiderent frigidam. Ex his  
omnibus satis manifestū est,  
quæ, qualis, quanta, & quibus  
danda sit frigida.

Quæret forsitan aliquis ra-  
tionem cur aqua, frigidissima  
præstantissimum sit remedium  
harum febriū: febribus verò,

# DE FEBRIBVS

quæ ex inflammationibus viscerum fiunt, aduersissima. Nonnulli ad concoctionem materiæ dari putant, quod falsum est: Nã si ad materiæ cõcoctionem danda esset, illam possemus dare, antequàm notæ cõcoctionis apparerent. Eo si quidem tempore danda sunt medicamenta, quæ concoquunt, non post concoctionẽ, vt Medici præcipiunt.

Dicemus autem id fieri ad partium solidarum refrigerationem, & concoctionem & roborationem, vt verba Galeni superiùs citata docent, cum dicit: *Cùm ergo cõcoctionis notas in his videris, de quibus dictum est abunde in libris de crisis audacter frigidam dabis, quippe solidarum animalis partium natura roborata, datur & ad materiæ inutilis vacationem.*

Quod autem ad euacuati-  
nem detur, quæ sequuntur do-  
cēt. Prētenuatos humores ag-  
greditur, ita vt qui vtilis sunt,  
hos ad se trahat, inutiles vel  
per ventrem vel per cutim eii-  
ciat. Illud confirmat, quod  
scriptum est paulò ante lib. 9.  
Methodi de incommotis a-  
quæ frigida vel intempestiue,  
vel immodicè exhibitæ. Por-  
rò incommoda, quæ frigida  
portionem intēpestiue immo-  
dicèque exhibitam sequuntur,  
in his consistunt, quòd lentos  
crassosque humores, siue hi  
obstructiones, siue putredinē,  
siue phlegmonem, siue quis  
erysipelate, aut scirrho, aut œ-  
demate est affectus, excitaue-  
rint, digeri prohibeat.

Ergo quoties febris ex his  
accenditur, atque ad eos eua-

cuãdos frigida data non con-  
ducit, ad præsens quidem non  
paruum adfert leuamen, pro-  
pterea quòd causam eius ad-  
huc præstet, aliam denuò ac-  
cendi est necesse, nonnun-  
quam difficiliorem: propterea  
quòd densum ex frigida cor-  
pus est. Huius rei certissimam  
dat fidem experientia. Vide-  
mus enim in dies post largam  
aquæ frigidæ potionem sudo-  
res à toto corpore prorumpe-  
re, & cremēta per ventrem  
expurgari non solum in hac  
febre, sed etiam in accessioni-  
bus febrium intermittētium.  
Potionem aquæ frigidæ post  
concoctionem materiæ præ-  
sertim in declinatione, sudo-  
res mouere experiuntur, & fe-  
brem extinguere. In principio  
autem refrigeraret, incrassaret

& nullam vtilitatem præstaret, quia nullam euacuationem faceret. Mouet autem sudores désatis partibus interioribus, & solidis corroboratis. Partes enim solidæ humectatæ & refrigeratæ quandam faciunt humiditatem, aut vaporem ad ambitum emittunt, ex quo sudor fit, aut vaporem retentum in ambitu corporis extrâ propellunt, vel vt partes superiores ventriculi cōstrictæ, recrementa deorsum propellunt: Sic venæ maiores aqua frigida compressæ ad minores venas fumos & recrementa propellunt.

In febribus cum inflammatione non conuenit; propterea quod digestionem & euacuationem prohibet. Nam si inflammatio vel Erysipelas sit



in hepate, vel splene, per seces-  
sum, vel per vrinas materiam  
expurgari est necesse, per mea-  
tus illos strictos, qui strictiores  
fiunt potione aquę frigidę. Vt  
ergo aquę frigide potione cō-  
modè vtamur, danda est ope-  
ra, vt partes inflāmatione ob-  
fessas, aut tumore aliquo distē-  
tas exactè cognoscamus, vt a-  
quā frigidam his, qui citra in-  
flāmationē febricitāt, demus,  
aliis verò minimè. Est quoque  
utilis hæc dignotio ad sangui-  
nis missionem faciendam: Nam  
si citra tumorem, & inflamma-  
tionē febris fiat, nihil refert à  
quâ parte trahatur sanguis: sin  
inflammatio in hepate, à parte  
dextrâ; si in splene, à sinistrâ, vt  
euentatio fiat secundum recti-  
tudinem.

Partes autem affectę co-  
gnoscon-

gnoscentur ex tumoribus, doloribus, excretis, & functione læsa, vt Gal. lib. de locis affectis docet ex quo loco, req̃re si velis. Hactenus de aquę potione.

Porro cùm hæc febris sit ex earum numero, quæ symptomata habent grauiora, horum ratione aliquid faciendum.

Sunt autem symptomata grauiora, quæ febrem sequuntur, dolor capitis, sitis vehemens, delirium, vigiliæ, & in quibusdam somnus profundus. Dolor capitis mitigatur oxyrhodo, oleo violaceo, Nenupharino, lacte muliebri recen-ter emulso, & aliis refrigerantibus. Iisdem remediis vtimur in superflua vigilia: hoc tātū nomine differunt, quod quæ ad somnum conciliandum fiunt, minus aceti recipere de-

E

bent, quia acetum vigilias inducit. Iisdem remediis admiscetur albumen oui fortiter agitatum: quod quia suo lentore nimium obstruit, ob id priore vtendum, nisi cum acida medicamenta, vt pulueres, sunt adhibenda, istis remediis refrigerantibus, vel ad dolorem capitis, vel ad somnum conciliandum non est vtendū ex qualibet causa. Propterea & hæc medicamenta repellunt à capite, & fortiter repellendo eruptionem sanguinis per nares impediunt. Quam ob causam si dolor sexto die oboriat, præcedentibus signis concoctionis, hypocondriis tensis, facie tota rubescente, venis circa caput distentis, & arteriis multum pulsantibus, non est vtendum istis refrigeranti-

bus supra caput, neque syrupo de papauere, ne fluxus sanguinis è naribus. (qui solet has febres magna ex parte terminare) impediatur: tunc enim satius erit expectare diem sequentem in quo iam natura coepit expellere materiam.

Quod autem talia medicamenta possint crîsim impedire, lipis & tonsoribus manifestum est.

Sitis & potionibus & inspirationibus aëris frigidi, sedatur: inter omnes syrupos violaceus principatû obtinet, quia refrigerat & humectat. Idem præstat cõserua violarû, Iulep ex violarû aqua, Alexandrinû, & similes syrupi, qui refrigerant & humectant, qui amari non sunt, sed palato grati.

Si æger ventriculum habeat

E ij

imbecillum, tunc cōdita paramus, quibus cum aqua vtatur. Parantur autem ex conferuis frigidis & humidis, vt ex conferuis violarum, nymphaeae, florum borraginis, buglo, quia humidæ sunt & caloris temperati. Quòd si aliæ conferuæ ponantur, id fiet propter aliquod aliud symptoma. Sed hoc potissimum obseruare oportet in delectu harum conferuarum, vt palato gratæ sint, veluti quæ neq; nimium odoratæ sunt, neque saporem nimium medicamentosum habent. Conferua florum cichorii, quia amara est, reiicienda: solemus aliquid puluerum cordialiū admiscere, vt puluerem Diatragacanchi. frig. vt eos, qui neque nimium amari neque inimum odorati sunt,

neq; nimum ficcant, aut constringunt, vt puluis Tria sandalli, vel puluis Diarhodum abb. Vel puluis diamargariti frigidi, Saccharum rosatum tabellatum additur in magna quantitate. Horum autem medicamentorum paradigma tale est. Si ventre sit nimum laxo fiat ex conferua rosarum in maiori quantitate, ex conferua buglossi vel boraginis, in minori, vt.

℞. Cōseruæ ros. ʒij. buglo. ʒß. pulu. triasand. & diatragac. frig. añ. ʒß. Sacchari ros. tabulati ad duplum pondus omniū hoc modo gratius quidem fiet cōditum: Efficacius verò, si addatur ʒj. pulueris pro ʒj. Sacchari.

Si autem non sit ventre laxato, damus ea quæ magis hu-

E iij

meētant, vt facit conserua viol-  
larum cum pauca quantitate  
puluerum: quia pulueres ferē  
omnes videntur resiccare, vt.

℞. Conser. viol. ℥ij. Conser.  
borag. & Nenuphar. añ. ℥ss. pu-  
lu. Diatrag. frig. ℥j. Sacchari  
q. suff. fiat conditum.

Damus Cochlear vnum cō-  
diti humectati aqua frigida,  
postea syrupi diluti aqua, vel  
aquæ frigida cyatum vnum.  
Alij condita miscent aquæ, &  
sine syrupo bibunt.

Humectat autem aqua, quia  
propter linguæ & oris aridi-  
tatem quandóque deuorare  
non possunt, quandóque pro-  
pter siccitatē oris, tracheæ ar-  
teriæ, aliarúmque partium fre-  
quentiùs bibere cupiunt, pro-  
pter quam occasionem illis  
conceditur frequēs oris ablu-

tio cum aqua frigida, additis aliquot guttis vini albi, vel paucō aceto. Dantur pruna, cerasa, exsiccata, & in aqua macerata, vel poma in taleolas diuisa ad oris humectationem. Propter illam summam siccitatem redditur arida & scabra lingua, ad cuius asperitatem tale remedium conficitur.

℞. Mucilaginis seminis psyllij integri vel Cydoniorum extractæ in aqua ros. vel viol. ℥β. Sacchari parū, fiat ad formam Lohoth, teneat sæpè in ore. Idem potest fieri ex mucilagine gummi Tragacanthi vel Arabici. Assumuntur ista post absolutam oris ablutionem, & linguæ deterfionem.

Delirium fit & phrenitis, curaturque iisdem remediis, sci-



licet repellentibus à capite in principio : sufficiunt autem repellentia ea , quæ ad dolorem capitis præscripsimus , & ista solent sufficere ad curationem delirij , quòd à fumis tantum sursum elatis fieri consuevit.

Ad phrenitidem verò curandam remissione opus est, quia est inflammatio involucrorum cerebri, quæ per deflexionem fit, vt omnis inflammatio fieri solet. Fit autem reuulsio, sanguinis missione facta per venas cephalicas, si vires & ætas consentiant , & si per illas totum non liceat emittere sanguinem. Cucurbitulas apponemus , reuulsione causa, in partibus internis coxarum, & ad deriuationem collo potius, quàm omoplatis , vt vulgus medicorum facit. Sunt au-

tem ponendæ supra ramos venarum, aut saltem propè, quia retractio debet fieri per magnas venas non per capillares, per quas non potest fieri magna sanguinis euacuatio in his qui abundant sanguine. Scarificatio faciendæ est post applicationem, vt sanguis ille attractus exeat, & inflammationem non pariat in parte scarificata.

Et ob id rursus applicantur cucurbitulæ post scarificationem cum paruo igne, & citius auferuntur. In scarificatione autem faciendâ animaduertendum est, ne fiat supra magnas venas, neque nimum profunda, ne venæ magnæ aperiantur.

In quibus magna timetur debilitas, ob sanguinis missionem, vtendum est cucurbitu-

E. v.

lis sine scarificatione , aut strictis ligaturis dolorem inferentibus.

Clysteres erūt acres & pun-  
gētes sine calfactione magnâ,  
ob id non probo vsum bene-  
dictæ, neq; hyreæ picræ, quia  
nimium calfaciunt, & resic-  
cāt: satis erit clysteri præscri-  
pto augere quantitatem succi  
ciclæ, vel addere succum mer-  
curialis.

Quòd sicogamur fortius hu-  
mores retrahere ad partem in-  
feriorem, satiùs erit decoque-  
re aliqua medicamenta sim-  
plicia, aluum laxantia, in no-  
dulo ligata, vnà cùm herbis fri-  
gidis, & humidis, quibus ca-  
stigabitur nimia illa siccitas:  
nā minùs siccāt ista, quā com-  
posita medicamenta ex istis &  
odoratis, qualis est Benedictæ.

compositio, quæ Esulam, agaricum, & alia medicamenta recipit.

Sic parabitur clyster:

℞. decocti clyst. præcedentis lib. iß. cui adde parietariæ, Mercurialis añ m. i. agarici in panno raro ligati ʒj. vel ij. & in li. i. colat. Diff. mel. viol. & succi ciclæ añ. ʒij. olei violati ʒiij. misce: fiat clyster.

Addi potest succus Mercurialis loco succi ciclæ, vel singulorum ʒj. idem clyster utiliserit in somno prouocâdo. Si phrenitis perseueret, nec repellatur, tunc ad topica remedia veniendum erit, scilicet à repellentibus ad digerendū, sed per media, vt in illis tumoribus præter naturam facere solemus, in quorū incremento, & status principio di-

E. vj.

gerentia repellentibus admiscemus, pro ratione digerendæ materiæ, vel impactæ.

Quòd si maior sit materiæ copia collectæ, quàm fluentis, plus digerimus: si autèm plùs affluat, quàm sit receptum repellentia digerentibus præualent. Vt autèm clariùs hæc intelligantur exempla proponam, si priùs admonuero partem affectam duobus modis posse considerari, vel vt partem principem, vel vt partem, sitam in profunda parte, carne coopertam, ob cuius situm, quæ fortiùs digerunt, vel refrigerât, vel penetrant, vsurpantur, vt acetum, Mandragora, papauer, hioscyamus, castoreum, spondylium. Hæc autèm sunt extrema remedia, propter cuius partis facultatē,

omnia quæ vehementia sunt, reiicienda erunt. Pars enim princeps, non potest ferre citra noxam supra modum resoluentem. Est siquidem caloris naturalis robur conseruare. Sed vtimur moderatis in principio, postea fortioribus, vltimo loco vehementissimis. Moderata sunt quæ cõficiuntur ex ol. ros. omphacino, & aceto, oleo nenupharino, ol. viol. de semine lactucæ. Fortiora præparantur ex oleo de papauere, de semine papaucris, & aliis frigidioribus. Vehementissima ex opio, Mandragora, hyosioquiama, & similibus. Remedia vel in formâ liquidâ, vel in formâ siccâ exhibentur. In formâ liquidâ, vt oleis suprâdictis. In principio, statu, & declinatio-

ne, & semper additur acetum ad penetrationē aliorum medicamentorum, vel fiunt decoctiones ad embrocationes faciēdas ex alto, & ad repellendum & digerendum. Ad repellendum sic.

℞. Lactucæ m. i. fol. salicis m. i. flor. ros. viol. & nenuph. añ. p. i. fiat decoctio. Quandoque additur semen papaueris albi, vt fortiùs sit remedium. Quòd si radices mandragoræ, aut seminis hioscyami aut papaueris nigri addideris, extremum erit.

Hac embrocatione ytimur in delirio, phrenitide, & superfluis vigiliis. Quòd si primæ descriptioni adiiciantur flores stechados, & roris marini, vel Camomillæ, vel saluæ, repellit simul & digerit. Quòd si ex

hac decoctione detrahantur aliqua infrigidētia, & augeantur calefacientia, medicamentum erit fortius, & digerens: Sin in totum auferātur repellentia, & addantur aliquæ herbæ, aut radices calfacientes magis, & digerentes, fortissimum erit, veluti si radices Iridis, spondylii, calamii aromatici, aliorumque odoratorum addantur.

Hoc remedio tātum in declinatione phrenitidis vten-  
dum, & in augmento, & in staculethargi, aut somni profundi, aut aliarum affectionum cerebri frigidarum. In forma sicca conficiuntur pulueres, quibus inspergitur caput, vel cum albumine oui excipiuntur, fronti applicantur, vt,

℞. Ros. rub. viol. nenuph.



añ. ℥ij. feminis lactucæ ℥iij. misce fiat puluis.

℞. feminis papauer. albi & nigri añ. ℥ij. addantur supradictæ, & inspergatur caput, vel excipiantur albumine oui, & applicentur fronti. Vel solemus perfundere caput, oxyrhodino, deinde inspergimus pulueres. Vel in statu, & declinatione pipionem, vel catulum capiti apponimus, post insersionem puluerum digredientium, & resoluentium, pulvis talis erit.

℞. rad. iridis, calami aromat. añ. ʒj. gariophyll. ʒß. Sandalorum omnium ʒj. florum Camomil. anthos, & stechad. añ. ʒß. misce, fiat puluis. Inspergatur caput, postea superponatur catulus, aut pulmo veruecis aut pullus gallinaceus. Sic

hic vltimus puluis misceatur  
primo, fit medicamentum me-  
dium, quo vtantur in statu.

*De Synocho putrida ex Fernelio  
cap. 5. lib. 4. Patholog.*

Putrida Synochos febris est  
continua ex putrescente san-  
guine prognata. De eius exor-  
tu summâ quidem diffensione  
certât artis proceres, possitne  
sanguis putrescere, & quæ hinc  
prodit, synochosne sit, an bi-  
liosa febris. Cæterùm potest  
eorum cōtrouersia hac obser-  
uatione dirimi.

Sanguis bifariam putrescit,  
vno generali modo, quùm vi  
caloris præter naturam segre-  
gantur, quæ in eo sunt substan-  
tiæ dissimiles, & bilis flaua, ac  
tenuis, ab atra, quæ crassa ter-

# DE FEBRIBVS.

renaque est, fecernitur. Hæc autem degeneratio veriùs corruptio, quàm putredo censetur, vt alio loco dilucidius explicatum est à nobis, atque, si sanguis hac ratione putrescat accendaturque febris, ea non Synochos, sed vel biliosa, vel melancholica euadet. Alio modo verè sanguis putrescit, cùm citra substantiarum diremptum, aut secretionem totus corrumpitur magno fætoze, ac graucolentia: vt enim è venis in pectus, in ventriculum, in intestina, aut in aliam capacitatem sanguis præter naturam effusus vitia- tur, & quasi in venenatâ substantiam putrescit, & in musculos irrumpens, tumorem præter naturâ phlegmonem que pariet, atque putrescit pri-

mum, deinde suppurat: ita dubitari non debet eum validis ex causis, vt in putrida atque in pestilenti cœli cōstitutione in venis maioribus putrescere. Quin etiam quum phlegmone têtatur iecoris substantia, sanguis totus non modò putridus, verum etiam nonnumquam purulentus existit. Sed & omnes fatentur sanguinem, tam magna interdum mutatione deprauari, vt non amplius ad habitum redeat naturalem, nec possit iterum per naturæ concoctionem ad primam humoris bonitatem redire. Denique per febres qui detrahitur sæpe animaduertitur nō solū fætibus & graeuolens, sed etiam putridus, adeò vt nec sibi cohærere, nec con- crescere queat, omnibus scili-

cet eius fibris putredine consumptis. Hoc igitur modo cùm sanguis corrumpetur, synochos accendetur putrida &c. De causis prægressis & signis vide reliquum caput.

*Curatio Synochi putridæ ex Holler. lib. lib. 1. de morbis internis cap. de febre putrida continua.*

In febribus putridis, & continuis quædam intermittentibus respondent, nisi quòd neque rigor, neque frigus præcedit. Non sequitur vomitus, aut sudor, intermissio nulla est, sed tantùm remissio, quarum curatio eadem in genere quæ intermittentium est, seruata eâ ratione, quæ in exquisitâ tertianâ, & ardente dicta est. Sūt & synochi peculiariter appellatæ febres. Aliæ quidem ho-

motoni, quia ab initio ad finem vna eadēque exacerbatio est, ac veluti tenor vnus accessionis. Aliæ ab initio ad finem perpetuò increscunt, & Epacmasticos appellat Hippocrates, vt paragmasticos, quæ initio efferantur, paulatim crescunt, quibus materia est sanguis, qui in maximis venis conclusus, inguinibus, & clauiculis interceptus efferuescit. Is autem aliquando supprat, quantitate, aliquando crassior est, nonnunquā etiam putredinem cōtrahit: ex quorum distinctione consiliū vniuersale curationis trāsferri debet. Fingamus ergo Dionem iuuenem, aut ea ætate, qua definit adolescentiā, continua febre laborare, pulsus magnus sit, velox, & æqualis, vrinæ

fanis proximæ, horror nullus,  
 aut rigor, calor mitis, ac vapó-  
 rosus, corpore benè carnosò,  
 tumētibus venis, sensu disten-  
 sionis, rubente facie: adsint  
 quoque cætera, quæ sanguinis  
 generationem ostendant, sta-  
 tim colliges febricitare ex ob-  
 structione, quam efficit san-  
 guinis plenitudo: Itaque faci-  
 le cōsiliū est: detractò enim  
 sanguine tollitur plenitudo, &  
 depletâ copiâ sanguinis libe-  
 ratur obstructio. Nihil verò  
 reliquum est, quàm vt corpus  
 quod per febrem alteratū est,  
 suæ naturæ restituamus. Quòd  
 quia nimium incaluit refrige-  
 randum est, vt hæc duo reme-  
 dia sanguinis missio, & tempe-  
 stiū frigidæ vsus, vel eorum  
 quæ refrigerant, & humectant,  
 exactè percurent synochum.

Phlebotomia auctoribus  
Græcis Medicis ex interna  
dextri brachij etiam ad animi  
deliquium esse debet. Quòd  
si vires, aut alia repugnât, quo-  
minùs tantùm materiæ simul  
auferatur vacuationem parti-  
ri oportet, vt in mulieribus  
propter mēstrua, in aliis etiam  
propter suppressam aliquam  
vacuationem, ea seruanda ra-  
tio, quam sæpe diximus. Re-  
petendum quoque, vt si quid  
vel cruditatis in ventriculo, &  
primis venis, vel si quid vere-  
ris stercoris in intestinis, hoc  
quidem clystere molli: Crudi-  
tas verò molli pharmaco ante  
phlebotomiã excludatur. aut  
si res patitur, & tempus, crudi-  
tas illa frictionibus & vnctio-  
nibus, & aliis remediis con-  
coquatur. Post phlebotomiã



duabus aut tribus horis mul-  
sam Græci propinabant, ex  
hinc horâ, ptisanæ cremorem:  
Nunc veró mulsæ loco, quæ-  
quidem suspecta est, in magno  
calore, aquâ coctâ, cui octaua  
pars sacchari commixta sit, v-  
tendum est: deinde hordeato  
loco cremoris ptisanæ.

Victus in reliquum tempus  
instituedus est, qui refrigeret,  
& humectet. Is autem tenuis  
sit, & magna ex parte in sorbi-  
tionibus. Itaque nostro more  
iuscula conueniunt è iuniori-  
bus pullis gallinarum vel vitu-  
linâ carne molliusculâ. Alte-  
râda verò ex acetosa, lactuca,  
& portulaca. Potus, aqua hor-  
dei, syrupus violatus, oxyfac-  
chara simplex, dilutum vel  
hæc oxyfacchara.

℞. Aquæ coctæ lib. 4. Sac-  
chari

chari lib. i. acet lib. ß. fiat potus clarificatus pro pastu & hora sitis: Verùm in aceti, & sacchari modo id obseruandum est. In mulieribus, in gracilibus corporibus, in iis quibus intestina facilè mordentur, & radūtur, aceti vsus suspectus est, aut certè minuendus modus: quantò maior calor est, tantò minor modus debet esse sacchari. Apparentibus signis coctionis nullus potus melior est aquâ frigidâ, postea vino albo tenui, aquoſo vti licet, ex quo & sudores, & vrinæ prouocantur.

In morbo, si resistit aluus, clysteribus mollibus incitanda est. Si verò etiam crassities humoribus accedit, incidēda & attenuanda est, diluto oxymelite & aliis sæpè enu-

meratis ; Quòd si materia incisa, vrinis aut sudoribus vacuata non est, leui pharmaco vti licet, Manna, Cassia, Rhabbaro.

Præterea videndum est, ne densata cutis, obstructa vel occlusa obstructionem faciat, à qua & putredo & febris. Et, si quidem frigore densata est, calidis laxantibus vtendum erit, vt Chamemelino. Si densata, adstringentibus: & siccata, ad ea quæ humectant, refugendum est, vt hydræleum. Et iam, apparentibus signis coctionis, ad balneum aquæ dulcis. Si verò occluditur cutis humorum copiâ, vacuatione opus est: si humorum crassitie, attenuantibus vtendum est: si lentore, detergendum. Practici maximam par-

tem curationis in refrigerantibus collocant, quæ conficiuntur ex hordeato mundato, prunis damascenis, glycyrrhisa, quatuor seminibus frigidis, Endiuia, scariola, cichorio, lactuca, rostro porcino, acetosa, floribus violarum Nenupharis, buglossi, boraginis, & aliquando aliquid aceti adiiciunt. Nonnumquam syrup. capill. veneris, portulacæ, acetosæ, & aliis supra dictis vtuntur, syruposque diluunt aquis vel decoctis endiuia, capillorum veneris, portulacæ, acetosæ, & similia.

*De Hæctica febre ex Fernel.*

*cap. 16. lib. 4. pathol.*

Febris hæctica est calor præternaturam in cordis substantia primùm ac per se hærens & infixus. Hic autem cordis

vitalisq; principij, mox etiam reliquarum partiũ similiarium substantiam obsidet, quòd omnis cordis intemperies mox corpori reliquo facilè imperiatur. Consistit in cordis partisue similis substantia, non quidem leuiter vt Ephemerae, aut putridae febris calor, qui ex accenso spiritu vel humore in partium similiarium substantiam quadamtenus effunditur: sed penitus quasi immersus primùm ac per se in propriam partis substantiam infigitur. Quùmque partis similis duplex sit calor, vnus elementarius, alter diuinus, non hic quidem, sed vnus elementaris supra modum auctus, heticæ febris est essentia, cuius tamen vi tum diuinus ille calor, tum quicquid in similari

parte consistit, tãdem exhauritur. Et enim partis similis triplex est substantia, solida, humida, & spirituosa. Humida rursum triplex, carnosã, quæ nil quàm cõcretus est humor alimentarius: primigenia, quæ propria est calidi innati substantia, in qua & spiritus & calor innatus primùm consistit; Aqueã seu elementaris quã tanquam glutino solida substantia cohæret ac persistit.

Quum itaque febrilis ille calor cor & vnãquãque partem similem inuadit, primum quidẽ carnosã quoque illius substantia incenditur & efferuescit: ac quandiu nihil eius aut exiguum dissipatum est, primus est febris hecticæ gradus. Secundus quum amplius procedente calore, aut

plurima aut tota. carnosā hæc substantia absumpta est; Nam & huius multi existunt ordines. Tertius hecticæ gradus est, quum absumpta carnosā substantia, calor ille febrilis & immanis primigenium humidum manifestè depopulatur: hic verus est marcor, & febris hectica cū marcore, quā Græ. *μαρασμοδὴ* & *περιφρυγὴ* appellant. Per hanc quidem insitus spiritus atq; calor q̄ eo humido innititur, omnisque hinc prodiens facultas magnam facit virium iacturam: hinc & corporis vires omnes marcescunt & languent, omnesque functiones intercidūt. Hæc si manifesta iam est, penitus immedicabilis existit, &c. vide reliquum caput.

*Curatio heſtica febris ex Holler.  
lib. 1. de morbis internis cap. de  
heſtica.*

In curatione hæc maximè obſeruanda ſunt, an ſimplex ſit febris heſtica, an 'coniuncta ſit febris putrida, Eryſipelas, inflammatio, an ſyncope frequens incidat : hæc enim remedia heſticae interpellant. Simplex nullo maiori remedio irritari debet. Maiora remedia ſunt, phlebotomia & purgatio. Deinde vehemens tum animi, tum corporis motus ex cap. 7. & ſequentibus lib. 9. Meth. vitandus eſt. vnicus ſcopus eſt, vt refrigeres & humectes : idque partim balneis, partim alimentis, tum etiam Epithematibus, rebuſque non naturalibus. Quod ad balnea attinet, exoleuit

F iiij



iam curiosus ille apparatus veterum balnearum , nec nisi cum periculo tentari potest. Exoleuit etiã consuetudo: & si quid in apparatu peccatũ est, grauius esse solet: itaque hoc tempore proximè lectũ ægri labrum aqua plenum disponi potest.

Quòd si vapor balnei ægri corpore excipitur, priùsq̃uam immergatur, salubre est. Itaq; linteo cõuolui potest, vt duobus pluribũsue hominibus teneatur, ita frigidum aerem inspiraret, reliquo corpore per raritatem lintei vaporem balnei excipiat. Iam rarefactis poris corporis, ac posteaquam æger vires receperit, satĩsq; quieuerit, aliquoties aqua tepida & temperata immergi potest. Mora sit pro ratione virium.

A balneo quoq; corpus oleo inungi potest , vel communi, vel nenupharino, vel violato, de cucurbita. Cæterum quòd aliquando monuimus , & hic quoque summopere obseruandum est, nec oleum, vel rancidum sit, vel falsum, quod vix reperias multis in locis. vbi itaque commodum oleum defuerit , butyrum recens vel per se, vel prius ex aqua violarum lotum vsui esse potest.

Subiiciebant veteres balneum è frigida, quod suspectum esse potest , nisi & vires consentiant; estas sit, consuetudo frigidi balnei , temperamentum calidum & siccum, nulla cruditas nullus tumor, nulla plenitudo. Alimenta imperari debent lac asinæ , vel mulieris, bubulū etiam vsui esse potest.

F v

Sed eligendum lac est , probandumque notis suis.

Sugatur è mamma, vel recens mulctum bibatur. Periculum fit mensuræ lactis datis primùm ℥ij. deinde iij. vel etiā iij. Quòd si in ventriculo non corrumpitur, paulatim augeatur modus ad lib.ß. Corrumpi intelliges partim è ructu, maximè nidoso, partim expulsi qui debilior, tardior, rarior, languidior factus est. Quòd si ructus nidosus est, poterit aliquid aquæ incoqui cum lacte. Si accidus, momentum mellis, aut sacchari misceatur.

Hordeatum quoque maximè conuenit, vel ptisana ex tritico comparata, & colata, iusculum item pulli gallinaei, in quo hordeum mun-

datum , & excorticatum co-  
xerit , alteratum cum lactuca,  
& portulaca.

Et quia in hecticis vis attra-  
ctrix infirmior est , liquidio-  
ra sunt alimenta , alioqui a-  
ceti modicum etiam si videri  
possit nocere , quia desiccet,  
misceatur lactuca , portulaca  
ex aceto diluto , aqua etiam a-  
liquando frigida ; quanquam  
modus esse debet , nec adeò  
gelida, nec multa exhiberi de-  
bet , vbi nimis extenuatum  
corpus est.

Potiones frigidiusculæ, so-  
lidiora alimenta non ita fri-  
gida , sed subtepida impe-  
rentur , Epithemata ex farina  
hordeacea, quæ subiges è suc-  
co lactucæ, oxalidis, sèperuiui,  
& similium. Portulaca per se.

E VI.

contusa stomacho & hypocondriis vtiliter apponitur. Alioqui.

℞. ceræ lotæ ℥iij. olei rosati similiter loti lib. i. liquefiant in vase duplici. Liquefacta refrigerescant, vbi refrixerint, ex aqua refrigeridissima, lactucæ succo, vel portulacæ subigantur, fiat cerotum. Inungatur venter, hypocondria & partes, vnde primùm hectica nata est. Alioqui linteolum subinde inculcatum omphacio, lactucæ, intybi, semperuiui, atq; eiusmodi refrigerantium succo, hypocondriis & thoraci apponemus.

Verùm in horum omnium vsu animaduertendum est alia quidem refrigerare, & humectare, alia siccare: humectantibus vtetur, si alui profluuium.

non est: tùm enim siccantibus  
 vtendum est, simul, & refrige-  
 rantibus: Denique quia breui  
 tēpore admota remedia inca-  
 lescūt, subinde mutare oportet.  
 Præterea partes spirales nō  
 sine noxa diutinā perferunt  
 refrigerantia, sed inde dys-  
 pnæa nascitur: omnia itaque  
 temperare oportet. Olea con-  
 ueniunt de Nenuphare, salici-  
 bus, cucurbita, papauere, vio-  
 lis, rosīs, Cydoniis, eadem ser-  
 uata distinctione in vsu siccant-  
 tium, & humectantium. Supra  
 omnia aër componendus est,  
 qui si temperatus, alterari non  
 debet: si calidior vt æstate, re-  
 frigerandus eo modo, quo ca-  
 pite de æstu dicemus. Hyeme  
 iam frigidior, quo tempore le-  
 uiter alterari debet, non tam  
 igne, maximè è prunis, quàm

leui flāma, aut vapore aq̄ calidæ. In ratione alimētorū considerāda est virtus: nutriemus enim pro ratione virium, lacte vaccino, à quo recens butyrum extractum sit, lacte asinæ: aut si nutriendū, q̄ alterandum magis, lacte muliebri. Bulū plurimū nutrit, sed ratione butyri nocere potest.

Caprillum quoque vsui esse potest, fugi debet vt antè diximus, vel recentissimè multum bibi. Plurimū nutrit panis sæpius lotus in aqua, deinde ex lacte recēs multo comedit. Plurimū ludatur aqua hordei, in qua cancrorū caro detractis testaceis coxerit.

℞. hordei mundati ℥j. cancrorum excorticatorum ℥ij. bulliāt in lib. ij. aquæ dum defiliat hordeum. Oportet ante excorticatos cācros prius di-

ligenter ablui, vt omnem fœditatem odoris deponant, deinde coqui. Potionum eiusmodi cancrorum mundatorum singulæ vnciæ, singulis lib. aquæ hordei incoqui debent. Similia ex cap. de phtisi repeti possunt. In instaurando hordeata, in quibus etiam vitellus oui dissoluatur. Aliquādo quoq; vt refrigeres, semen portulacæ, lactucæ, & similia concoquuntur.

Si à syncope metus est, aliquid etiā vini granatorū, margaritarū, semen acetosæ, alia q̄ cordialia appellāt. Iuscula carniū pmittūt, sed alterari oportet hordeo mūdato concocto oleribus, quæ refrigerāt, & humectāt lactuca, portulaca, scariola &c. Permittitur in potu aqua, in qua aliquid sacchari dissolutum sit.



Vinum granatorum fimiliter dulcoratum. In viribus infirmis, expressionibus, colatiis, distillatis, instaurantibus vtendū erit. Si à profluuiο alui metus est, aqua hordei paretur ex hordeo torrefacto, fimiliter & hordeatum.

Quib<sup>9</sup> addi possunt gūmi arabicū, miliū torrefactum, & alia eiusmodi, quæ sine calore aluū supprimunt. Auenatum loco hordeati ad tempus commodum est, etenim fluxiones alui supprimit. Sed dum symptomatibus consulimus, febris habenda ratio, & ad huius remedia tempestiuè redeūdum est. Caseus recēs sine sale paulò firmioribus cōuenit, vt vocata gelatina minùs firmis. Vinum dilutum benè cōtra syn- copem facit, & lapsum virium.

Cibus duabus horis ante balneum imperari debet aut paulò post balneum. In balneo non est exprimendus sudor: madidus enim vapor sufficit. Summatim in vsu balnei, ad vires diligenter animaduertere oportet. Multa quæ ad hanc febrem pertinent, ex cõmentariis de sanitate tuenda, Method. med. Libello de marcore colliges.

*De febre continua ex Fernel:  
cap. 7 lib. 4. pathol.*

Continua febris subiecta materia in vasis est maioribus, quæ in illis putrescens, aut ipsam de se putredinem, aut putrem vaporem in cor assiduò continentérque fundit, è quo assidua fit putrida febris, quæ conclusa nuncupatur: at quàm

DE FEBRIBVS

vel in inguine, vel in secretion-  
re loco coarctata hæret, tum  
nec putredinem, nec eius ha-  
litum, sed vnum calorem par-  
tium continuatione in cor in-  
fert, è quo solùm vel diaria fe-  
bris fit, vel symptomatica. Ea  
autem venarum materia san-  
guis est: in quo (si quidem ex  
æquabili humorum permistio-  
ne constet, synochus consi-  
stit: Si vero ab illius mediocri-  
tate deficientes vel biliosus, vel  
pituitosus, vel melancholicus  
appelletur, in eo putrida fe-  
bris excitatur continua.

Vbi igitur synochus non ni-  
si in temperata natura, quæ  
multo sanguine eoque medio-  
cri abundat, & quæ carnosus est  
habitu gigni solet: ita de putri-  
dâ cōtinua iis duntaxat obtin-  
git, q̃ ab hac mediocritate re-

cedunt biliosis, pituitosis, aut melancholicis. Hic autem vnū meminisse velim, quæ in Physiologiâ fufius demonftrauimus, in venis nihil præter sanguinem cum fero contineri, & quicquid foras effufum concrefcere potest, fanguinis nomine cōprehendi nullos illic fecundum naturam humores esse synceros, & superuacaneos, fed eos quatuor ex quibus fāguis cōstat, verè succos esse quibus alimur: neq; aliud illic bilē esse, quàm totius sanguinis partem tenuem, atque calidam, quam etiam biliofum sanguinem appellamus: neq; aliud pituitam, quàm sanguinis partem crudiorē: neque aliud melācholicū quàm terrenam portionem, & melancholicum sanguinem.

In quibus igitur non æqualis inest succorum permistio, ex putrescente æquabiliter sanguine, febris accenditur continua, & quibus sanguis multum biliosus est, tertiana fit continua: quibus is pituitæ quàm cæterorum humorum magis particeps fuerit, continua fiet quotidiana, & quum nimio perè in melancholiam deuerget, continua quartana: Est autem continuarum omnium genus duplex, vnum earum quæ ab initio in finem perseverant, nullo stato excandescentiæ ordine. Huiusmodi sunt synochos putrida, & quæ causus appellatur: alterum earum quæ nunquam intermittunt, remittunt verò & excandescunt, aliæ, quotidie, vt quotidianæ continuæ, aliæ alter-

nis diebus, vt tertianæ continuæ, aliæ quarto die vt quartanæ continuæ. Vide reliquum caput.

*Febris continuæ curatio ex Holler. lib. 1. de morb. intern. cap. de febre ardente.*

Bilis repurganda & extinguenda. Primùmque animaduertendum, vtro remedio potius vtendum fit, phlebotomiâ, an cathartico. In ideâ & omninò exq̃fitâ phlebotomiâ omittēda est. Suspecta quoq; in eâ quæ ad ideâ p̃ximè accedit, in aliis si numeri phlebotomiæ consentiunt, etiam ad animi deliquium authore Galeno sanguis detrahi potest. Nunc verò animi deliquium expectandum non est. Veteres etiam purgationibus utebantur, alij quidē fortioribus,

alij leuioribus: præferendæ leuiores. Hippocrates 4. de victus rat. in mor. acu. a sinino lacte cocto. Gal. etiam sero utebatur. Mollibus clysteribus ex iis quæ feruorem febris extinguunt, vtilicet, vt paratis è sero lactis, è decocto violarum, maluæ, rostri porcini, & similia.

Saccharū potiùs quàm mel, in his dissolue oleum violatum potiùs, quàm commune. Catharticum conueniens cassia est in, sero lactis dissoluta, aliquando etiam infusum Rhabbarum, quæque cap. de febre tertiana dicta sunt. Maxima pars curationis in extinguenda bile consistit. Extinguitur commodissimè victus ratione. Decumbat igitur loco suaui auræ exposito.

Quòd si locus sine vêtulo est, flabello vtendum est. Mollis sit culcitra, stragula & lintamina tenuissima, minimè aspera & fordida, ideóque contra errorem vulgi subinde commutāda sunt. Lectus amplior sit, vt subinde locum comutet æger. atque vt aër qui ambitur frigidus sit; corpus reliquum non ita perfletur, ac refrigeretur, præsertim accessionis initio, & incremento. Obscurum aërem commendat Hippocrates, alij neque obscurum, neque lucidum. De ea re iam disceptatum est cap. de phrenitide. Æstate etiam aër cubi- culi flabellis excitari, ac refrigerari potest, aqua putealis alioqui frigidissima è vase in vas sæpius trāsfundatur, vt etiā strepitus ad aures ægri perue-



iat. Solum internatur rosis, capreolis vitiū, lactucis, nymphaea, portulaca, & similibus, aqua rosarum, & aceto, aqua frigida : rami quoque è salicibus toto cubiculo componēdi sunt, ac subinde commutandi ; siccati enim iam laedunt. Quòd si aër non admodum calidus est, sed temperatus, eo contentus esse poteris. Victus potus sit magis, quàm cibus, mulsæ cocta sed diluta nostro more, aqua cocta modico saccharo condita. Quæ ex hordeo potiones, sorbitiones, alimenta comparantur, detractò cortice hordei, (ad tollendam siccitatem, cortex enim ficcāt) comparentur: hordeata diluta sint, aqua frigida ante vigorem vsui esse non potest. Aëtius permittit,  
 si

si quintam partem aquæ temperatæ ad aquam frigidam adicias. Verum potius vteris aquâ, vt prius, coctâ & modico saccharo violato conditâ, vt sit octupla aqua, sub octuplum saccharum.

Alioqui pane prius eloto, abiectâq; priore aquâ, aquam conficies, quam panatam vocant, eamque frigidissimam propinabis, sed maximè in vigore, & declinatione particularis accessionis multò liberius. Iam apparentibus signa coctionis, pruna multa, aquâ cocta cibo esse possunt. Præter hæc ceratum album refrigerans Galeni ilinendum est partibus, in quibus maior feruor est, vt hypochondriis, & thoraci. Dictum autem prius ex vnâ parte cere, quatuor

partibus rosacei simul liquatis, vase duplici comparari: atque ubi refrixerit, in aquam frigidissimam demergi debet, subigi que, vel succo lactucæ, vel semperuiui, vel eorum quæ refrigerant simul, & humectât. Si in thorace feruor est, loco rosacei, violaceum eligendum est, meliùsque fuerit olea prius elui. Rosaceum ex aqua rosarum, violaceum ex aquâ violarum, quæ quia statim incallescunt, subinde commutanda sunt: fiunt & cataplasmata ex farinâ hordeacea, subacta succo lactucarum cucurbitæ, Cucumeris, nenupharis, polygoni, plantaginis, capreolorum vitis, & similium: folia lactucæ, ramenta Cucurbitæ, aut Cucumeris, manibus contrectentur, & admoveantur plan-

tis pedum. Extrema quoque aquâ frigidissimâ immergantur, cui, si vis, tantillum vini commixtum sit ad penetrationem, vel ad refrigerandam frigidæ vim, contineat in ore, & linguâ folia portulacæ, lactucæ, aut acetosæ. Genitalia inuoluantur linteo subinde inculcato in miscellâ, ex aqua rosarum, vino tenui & aceto: Etenim mirabiliter contra æstû facit. Poteris os colluere aquâ frigidâ, vel simplici vel refractâ quintâ parte temperatæ. Veteres etiam cochleare succi rosarum, contra æstum stomachi propinabant.

Verùm in usu horum omnium frigidorum, obseruandum tempus est: Nam initio, & augmento febris, non conueniunt. In vigore, & declina-

tione cū iam in superficie  
 calor diffusus est, æstus extin-  
 gunt : Alij pulmones recens  
 mactatorum animalium, colum-  
 bos, pullos, catellos diuisos  
 medios, & vt dicunt exentera-  
 tos, raso capiti, pectori, plātis,  
 hypochondriis admouent, vt  
 tepido calore, calorē igneum  
 foras attrahant ; Laxatis viis  
 fuliginem ducant, & per acci-  
 dens refrigerent. Veteres tho-  
 raci, & pectori linteolum hy-  
 drelæo calente madefactum  
 applicabant : alioqui lanam  
 quantū manu capitur, in aquā  
 & oleo rosaceo, vt violaceo  
 calefactis madefactum, expri-  
 mebant è sublimi in pectus,  
 modicum quoque salis, & ace-  
 ti adiungi potest: sic enim su-  
 dorem excitant. Ad refrige-  
 rium quoque lactucarum te-

nella germīna , calente poscā  
immergantur , deinde vel sac-  
charo violato conspergantur,  
alioqui ex oleo, & aceto come-  
dantur. Melius oleum rosaceū,  
sed prius abluatur.

Practici recentiores, miscel-  
la ex oleo chamemelino, acē-  
to albo , & aquā rosarum , hy-  
pochondria , pectus, & latera,  
quā maximè parte feruent,  
inungunt, & ita dolores miti-  
gant. Gal. lini semine in hy-  
dræleo cocto, & tepido admo-  
to hypochondriis, æstum, dō-  
lorémque mitigabat oxyme-  
lite quóque diluto, vtebantur  
multo, maximè vbi adstrictio-  
nis suspicio. Quietos esse opor-  
tet quantū in febris patitur.

De syrupis, & corū vsu iam  
antè dictum est. Familiaris est  
iulepus rosatus , syrupus de

limonibus, violarum, oxyf-  
chara simplex, fyrupus aceto-  
fus. Verũ fyrupos multâ aquâ  
coctâ, vel aquâ hordei excor-  
ticati, aquis scabiosæ, buglof-  
fi, & similibus dilui debent.

Aëtius diacodio vtitur: nũc  
fyrupo de papauere, de nenu-  
phare vtilicet. Aquę cõueniũt  
destillatæ è cucurbita, cucume-  
re, melone, portulaca, rosis,  
violis oxalide, & similibus.  
Sed oportet vel quartâ vel sex-  
tâ parte sacchari condiri, vt  
fiant iulepi. Iusculis quoque è  
carnibus vitulinis, iuniorum  
pullorum, gallinaceorum, al-  
teratis cum herbis refrigeran-  
tibus, æstum tẽperamus: multa  
verò incidunt, vt deliria, vigi-  
liæ, sitis, lĩguæ scabrities, animi  
deliquia, dolores, singultus,  
tussis, colliquationes, aliæque

eiusmodi, contra quæ remedia propriis capitibus dicentur.

*De Tertianâ febre ex Fernel cap.*

*lib. 4. pathol.*

Tertianâ febris exquisita, ex putrescente flauâbile superuacaneâ incenditur, idque vel in propriâ cysti, vel circû precordia canaque viscerum: è quibus tamen eius nonnihil interdum in venas irrumpens sanguini permiscetur. Hoc autem loco quiddam admonuisse lectorem iuuabit permagnâ ad artem totam momenti. Bilis superuacanea siue è proprio folliculo, siue è iecore redundans, quum impetu facto irrumpit in venas, vt in ictero, in tertianâ febre, nonnûquam & in continuâ, & aliis plerisque morbis non sanguini, sed



fero verè permiscetur, nec sanguis portio quædam fit, quemadmodum neque serum. Cuius rei hoc tibi argumentum esto, quòd in iis affectibus, si vena secetur, sanguis ille ex quatuor humorum permistione constans, purus, atque syncerus ( nisi aliunde vitium contraxerit ) apparet, nec citrinobilis colore infectus, sicque bilis ea superuacua nusquam videtur, cum sanguine cō crescere, tota quippe transfertur in serum, ei que tanquam vehiculo insidet, nisi fortè minimum eius, in spumam versum, per summa sanguinis innatet: ac proinde eius permistione in his febribus, vrinæ visuntur supra modum crassæ, atque citrinæ; Eos maximèprehendit qui naturâ calidi sicci que sunt,

habitu gracili, ætate floridâ,  
 qui laboribus, vigiliis, mærori-  
 bus, curis, ardoribus, victui  
 parco, calido siccoque assueti  
 sunt, qui iecur impetere calidum  
 obtinent: hi quippe bilis fla-  
 uæ prouentum faciunt, maxi-  
 mè quidem æstate, calidis sic-  
 cisque regionibus, & æstuoso  
 cœlo: si quid istorum deest, ex  
 quisiata tertiana esse non po-  
 test.

Repentè quidem hæc præ-  
 hendit insigni rigore, quò ple-  
 rùmque corpus omne concu-  
 titur, sub cuius finem excussa-  
 bilis sæpe vomitione redeli-  
 tur. Hinc calor breui accen-  
 ditur, & in omne corpus effun-  
 ditur, mox ad vigorem festi-  
 nans, acer, pungens, & inie-  
 ctam manum acriter feriens,  
 sed statim mitescens. Labo-

rans ita exurit, vt & corpus nudet, & variè iactet, & spirandi difficultate oppressus magnum multumque spiritum ducat, sitique eneectus frigidum expetat, vigiliis, capitis dolore, & irâ, furorêque percitus. Longissima accessio horarum est duodecim, interdum septem, vel quatuor, multo quidem sudore eoque calido, & vaporoso inclinans, quàm pura sequitur intermissio. Pulsus accessionis initio contractus, parvus, postea verò quam in cæteris celerior, atque crebrior, quòd refrigerij maior insit necessitas: vehemens, & validus, sed aliquantum durus ob arteriæ siccitatem, minimum inæqualis ob tenuitatem materiæ, cuius est facilis inflammatio, ob id etiam quòd

non minor sit refrigerij ex diastole, quàm expellendorum putridorum ex systole necessitas: vrina flaua, aut flammea, substantia mediocris, & odore grauis: Atque hæc pura quidem & exquisita tertiana est, quàm censuit Hippocrates septem circuitibus, quod longissimum est iudicari.

*Curatio tertianæ febris ex Holle.  
lib. 2. de morbis internis cap. de  
Tertiana Febre.*

Curatio ad duos scopos relata est veteribus Medicis, alterationem, & vacuationem. Alteratio refrigerantibus, & humectantibus: vacuatio per sudores, & vrinas perficitur. Paulus rectè quidem infirma hæc remedia credidit, propterea quòd non tertiana illa, que

idea & exemplum quoddam  
 est, reliquarum, nobis curan-  
 da est: sed quæ iam aliquid pi-  
 tuitæ commixtum bili habet.  
 Oportebit ergo intendere in  
 scopos illos veterum, sed ita  
 temperare, vt quantum decli-  
 net curanda febris ab ideâ illâ,  
 tantum curatio euariet. Ini-  
 tio ergo, si resistit alius, clyste-  
 re leui, vel debili quodâ phar-  
 maco mouenda est. Medica-  
 menta sunt, vt cassia fistula ex  
 decocto violarû, prunorum,  
 Tamarindorum, & similium.

Vehementer commendant  
 hanc potionem.

℞. succi granati acidi, & dul-  
 cis añ. ʒiʒ. per noctem salubri  
 loco resideat, postridie in eo  
 succo dissol. sacchari optimi  
 ʒj. Et si vehemens calor est,  
 Saccharû violaceum sit, & ad-

datur potioni aquæ rosarum  
 ℥j. Si verò pituitæ aliquid mix-  
 tum est, loco aquæ ros. misce  
 vini tenuis ℥j. Lenies alium,  
 reuocabis appetitum, partes  
 naturales roborabis. Quòd si  
 obstructionis suspicio est, aquã  
 end. aut hordei ℥j. commisce-  
 bis. Alij ℥ij. oxyfacch. sim-  
 plicis, succi Endiuie depurati  
 ℥j. vtuntur eadem utilitate:  
 vbi verò plus pituitæ mixtum  
 est, pro succo end. succus ra-  
 dio. fænic. pro oxyfacch. oxy-  
 mel simplex miscendum est:  
 atque utilius oxymel volunt,  
 in quo serbuerint frondes nu-  
 cis, vel tenues asparagi, & hyf-  
 sopi summitates: alij contenti  
 sunt ℥iij. decocti prunorum  
 cū facch. viol. ℥9. Eodemodo  
 & Tamarin. vti licet. Iam re-  
 mollitâ alio de phlebotomia

statuendum. Saluberrimum, inquit Gal. febribus omnibus non modo continuis, sed iis quæ ex putredine natæ sunt, secare venâ, si ætas, vires, &c. permittant: Omissum tamen hoc remedium à Græcis, & omittendum quidem, si exquisita tertiana est. alioqui admodum salutare: quod tamen téperare oportet, vt tertiana quam curamus, vel ad exquisitâ accedit, vel ab ea recedit. Arabes ex urinâ rubra cōsiliū sumunt phlebotomiæ, fallaci quidē coniecturâ: quòd eam dominantis sanguinis, vel grauioris incendij, indicium esse putent. Talis enim vrina aliquando infirmo ex hepate, vel rene, pl<sup>o</sup> æquo attrahēte, aut alijs de causis, non ex naturâ febris procedit. Addunt præ-

tereà non esse detrahendum  
 sanguinem ante tertium paro-  
 xysmum, obtruduntque expe-  
 rientiam, quòd quibus aliter  
 sanguis detractus est, iis ferè  
 exasperatum malum: secant fe-  
 rè sexto die: aut prædici iu-  
 bēt fore, vt proxima accessio,  
 quæ quarta est & die septimo,  
 grauissima, ne id ex phleboto-  
 mia, & peccato medici conti-  
 gisse videatur. Conueniunt  
 cum Græcis, in vsu eorum quæ  
 urinas mouent & sudores.

Vtuntur plurimùm oxyfacch.  
 simp. Syrupo aceto. Græci, si  
 materia sursum ascendit, & æ-  
 ger nauseat, vomitiones adiu-  
 uant: si mordentur intestina,  
 lenib. clyst. excludunt, alio-  
 qui lotia, & sudores mouent.  
 Vomitus cient ptisanæ tepidæ  
 ʒ4. sacch. ʒ6. Aliud.



## DE FEBRIBVS

℞. decoct. lact. atripl. portul.  
añ ʒβ. olei communis ʒij tepi-  
dè vtatur: Sed abstinendum  
vomitionibus in iis maximè,  
qui ex consuetudine non vo-  
munt. In Clyst. cass. ʒβ. aut ca-  
tholici, plus etiā, vt res exigit,  
diff. debet oleo viol. In iisdem  
vtendū est sacch. potiùs, quàm  
melle, apio & anetho mixtis,  
in potu, alijsq; leuioribus diu-  
reticis utebantur. Sudores  
mouendi sunt, siquidem resi-  
stunt, sub finem accessionum.  
℞. ptisan. vulgaris calid. ʒiiij.  
aut ʒiiij cū ʒj. decoct. florū cha.  
vel diluto oxymel. in quo ne-  
pethæ modicū ferbuerit, idq;  
magis, si crassior humor fuerit.  
Vsitatus est ptisanæ vulgaris  
potus calidus, cum sub duplo  
syrupi acetosi vt sint ptisanæ  
ʒiiij. syrup. aceto. ʒiβ. Vinum

quóque album, tenue, oligo-  
phorum, & vrinas, & sudores  
mouet. Verum neque vrinae  
mouendae sunt, neque expri-  
mendus sudor, nisi cum appa-  
ruerint manifesta signa coctio-  
nis, multò maximè, cum iam  
perfecta signa coctionis appa-  
ruerint; & quæ vomitiones  
mouent, tepida; quæ sudores,  
calida exhiberi debent.

Quòd si superioribus reme-  
diis non concedit febris, Rha-  
barbaro vtendum est ad ℥iſs.  
vel ℥ij. si verò neque his con-  
cedit, & vires sustinent, phle-  
botomia de eadem venâ axil-  
lari, internâ dextrâ repetenda  
est: aliòqui Catharticis paula-  
tim deducenda materia est,  
quale hoc est.

℞. syrup. de Cicho. simpl.  
℥vj. Rhabar. pulueriz. & no-

## DE FEBRIBVS

dulo raro inclusi. ℥ij. suspendatur nodulus, & syrupo immergatur, capiat diebus intermissionis ℥iſs. fyrupi cū aquæ hordei in calidiore conditione, hydromelitis in frigidiorē ℥ij. atque iam declināte morbo, & longius progresso, medicamentis catharticiſ aliquid eorum, quæ melancholiam purgant, miscendum est, pars enim materiæ ardore in melancholiam versa est.

In accessionibus, vbi vehementer sitiunt, sed maximè in statu aqua hordei, iulep violatum, syrupus violatus, cum aquâ frigidâ, vinum etiam album, oligophorum, siquidem iam tempus est sudoris promouendi, & vrinæ, exhiberi debent: Nec hoc quidem exiguâ quantitate, sed semel

quantum appetunt. Ratio victus quæ refrigeret, & humectet non tam tenuis, quam ab antiquis præscripta est, propter consuetudinem victus.

Licet enim vti iusculis plurimum alteratis cum lactucâ, acetosâ, portulacâ, hordeatâ, cum seminibus frigidis alterato. Postea verò apparentibus signis coctionis, lacte amygdal. pedibus ouillis, piscibus saxatilibus, cancris; percis & similibus; vitellis ouorum; de quibus quia controuersia est postea dicetur. Tumque iusculis commisceri debent, quæ aperiunt, & vrinas mouent. vsitatae sunt radices acetosæ, petroselini hortensis, & cichorii. Sed per omnia meminisse oportet, maiora remedia, vt venæ sectionem, & cathartica,

cōuenire diebus quietis. Excrementa verò promouenda, cū iam manifesta coctio apparuerit in vrinis. Vigilant, æstuant, sitiunt, & alia patiuntur, contra quæ remedia suo loco dicentur ad finem libri huius.

Remedia quædam sunt vulgaria, quibus quidem vti licet, non neglectis aliis, quale hoc est. Sonchus tritus, Sambucus, plantago, ex aceto subiguntur, & carpis alligantur. Sunt, qui & semperuium, & alia eiusmodi refrigerantia trita hepatis regioni applicent. Suspectum quidem hoc remedium, quanquam aliquando febrem extinguit. Sed nūquam hoc vtendum est, vbi obstructionis suspicio. Alij pul. fuliginis è furno, & saluiam contusam vnà miscent

cum oui albumine, & ita imponunt carpis. Nonnulli eandem fuliginem cum alliis cæpis, albumine oui & germine, miscent, acetum affundunt, admouentque carpis. Temeraria verò remedia caustica, quæ vesicas excitât, quale est quo vulgus vtitur, radice ranunculi tritâ, alligatâ carpo. Eadem quóque exteriore gutturi admouent. Itaq; prudenter vtendum est vulgi remediis.

*De quotidiana febre ex Fernel.*

*cap. 12. lib. 4. Pathol.*

Ebris vnaquæque intermit-tens à circuitus motusque ordine nomen habet. Hinc quotidiana, quòd quotidie typo simili redeat, amphemerina dicitur. Omnium quidem februm rarissima, & quæ vix ex

sexcentis vna obtingit : sed cum laborans quotidie febre conflictatur, id ferè à duplici tertiana fit. Vt autem paria statuerentur febrium atque humorum genera, hãc in pituita collocarunt : quæ tamen rarissimè putrescit, vixque eam putredine qualitatem consequitur, quæ febris essentiam compleat. Quum autem superuacua pituita ( cuiuscunque ea generis sit ) vel in intestinis, vel in mesenterio, vel circum ventriculum, viscerumque caua coercita putrescit, febrilemque qualitatem nanciscitur, quotidie mota conditionis suæ vaporem effundit, continentem accessionis causam. Accedit hæc quib<sup>9</sup> pituitæ copia inest, natura vel ætate humidior, obæsis, mulieribus, Eunuchis,

senibus, & iis qui vel otio, vel somno longiore, vel crebris balneis, vel frigidioribus, humidioribúsq; cibis, vel assiduâ crapulâ, vel edacitate, vt pueri, vel ebrietate cruditatis, ac pituitæ copiam congesse-  
runt: maximè verò hyeme, frigidis regionibus, & pluuioso cœlo. His ferè facies subliuida, & subtumida est, os ventriculi imbécillum, deiecta appetentia, acidúsque ructus frequens.

Accessio autem non repente, sed sensim inuadit, corporis extrema duntaxat refrigerans; rarò admodum rigore conueniens: corporis adest grauitas, & inexpugnabilis dormiēdi necessitas: plerúmqu; & hoc initio animus vel defectione, vel syncope læguescit.



Calor dein pedetentim & æ-  
grè augefcit, magnâ certè inæ-  
qualitate, qua modò calor,  
modò frigus percipitur. Ac-  
census dein calor non acer,  
fed hebes & habituosus tāgenti  
primùm occurrit, quasi ex fuc-  
censis viridibus lignis vapor  
sublatus, postea verò aliquan-  
tum mordax & acer. Quā in  
omne corpus iam effusus est,  
nullum vehemens incendium  
corpus nudare cogit, nec ar-  
doris compunctio id variè iq-  
ctare, nec spirandi difficultas  
multū frigidūmq; aërē duce-  
re, nec sitis vehemēs aquā fri-  
gidam exposcere. Inclinaans  
accessio primis diebus nullū,  
postea verò paucum sudorem  
effundit, qui pro vaporis spe-  
cie pinguis viscosusque est.  
Tota accessio horarū est octo-  
decim,

decim, intermissio sex, q̄ rarò  
integrâ purâque existit. Pulsus  
paruus, languidus, summissus,  
& rarus, præsertim accessionis  
initio, & incremêto, quòd na-  
tius calor frigidi, crassi visco-  
siq̄ humoris agitatione ve-  
hementer, præmatur: postea  
verò creber euadit, sed minùs  
quàm in tertianâ atque quar-  
tanâ, æquè tamē velox, atque  
in quartanâ: huius inæqualitas  
omni accessionis tempore,  
quàm in cæteris intermitten-  
tibus maior. Urina primis die-  
bus tenuis, & alba cernitur, ex  
crudæ materiæ copiâ, quæ &  
vehementer obstruit, & na-  
tium calorem obterit. postea  
verò quum materia coquitur  
eiusq̄ nonnihil cum urinâ  
præterfluit, rubra, crassa, turbi-  
dâque redditur. Alui deiectio

H

liquida, crudâ, pituitosa. His igitur, prima sæpè accessione, quotidiana febris dignoscitur, quùm præsertim quotidianæ populariter vigent.

*Curatio quotidianæ febris ex Holl.  
lib. 2: de morbis internis cap. de  
febre quotidiana*

Primis diebus cùm tenues sint urinæ, sæpè etiam albæ, utendum est incidentibus, & aperientibus: materia enim crassa, quam incidi oportet, & iisdem medicamentis liberantur obstructions. Verùm in falsâ, & dulci, iis quidem leuioribus, & paucioribus diebus utendum est.

In vitreâ & acidâ, fortioribus, idque pluribus diebus Græci & Arabes ad septimum diem vtuntur: iustus terminus

definiri non potest. Conueniunt itaque oxymel simplex, & hoc leuior, syrup. acetosus, aqua saccharo cōdita, cinamo-  
mo: fortiora sunt oxymel diu-  
reticum, scilliticum, syrup. de  
duabus, de quinque radici-  
bus, & alia descripta capitibus  
morborum phlegmaticorum.  
Laudatur plurimū melicra-  
tum, hyssopi, thymi, pulegij,  
stæchados, rerūq; similium.

Verū habenda est ratio, vt  
iusta sit proportio mellis ad a-  
quam. Nam vbi natura ægri  
frigida est, materia febris con-  
tumax, frigidum anni tem-  
pus &c. eiusmodi, sexta pars  
mellis misceri potest, alioqui  
vel octaua, vel nona. Hocque  
perpetuò meminisse oportet,  
in vsu syruporum oportere a-  
liàs plus, aliàs minus dilui. Ne-

que consuetudo recipienda, quæ tantum duplum aque, aut similis liquoris imperat, ut syrupos diluat.

Iam præparatâ materiâ, si quidem urinæ crassæ, & rubentes appareant, videndum est an phlebotomia conueniat. Nam & antè, si tales urinæ fuerint, conueniet multò magis, vbi vel pituita dulcis, vel salsa est. Arabes calidâ cōstitutione cæli, dextram basilicam; frigidâ, sinistram percutiunt, oportet autem parum detrahere, quia affectus est frigidior. Quod autem ad purgantia pharmaca attinet, nèque Cassiam, nèque tamarindos, aliâque eiusmodi leuiora recipiunt, quia stomachum offendunt, & tantum quod est subtile euacuât. Itaq;

& Aloë, Turpetho, carthamo,  
& aliis quæ dicentur, vti ma-  
lant.

Et quia semel non potest  
repurgari tota materia febris;  
epicrasi vtendum est. Primum  
enim, vt antè dictū est, mate-  
riam incidimus, & obstructio-  
nes liberamus, tūm pharmaco  
vtimur, eoque leuiori, sed quod  
stomacho non noceat. Quin  
etiam omnibus medicamen-  
tis commiscere oportet ea,  
quæ stomachum roborant: E-  
tenim in quotidianā stoma-  
chus ferè laborat: idque me-  
minisse oportet, salſam, & dul-  
cem pituitam leuioribus edu-  
ci posse, vitream, & acidā non  
posse: propterea in dulci & sal-  
ſa poterit conuenire hæc po-  
tio.

℞. Summitatum absynthij

H iij

P.2. pass. p.1. glycirrhizæ semi.  
anisi, & fœniculi añ. ʒj. fiat  
decoctio in quâ diss. cathol.  
ʒj. Mellis rosati colati ʒiʒ. fiat  
Potus.

*Gathartium Auicennæ.*

℞. Mastichis, zinziberi, tur-  
pethi benè gummosi añ. ʒj.  
Sacch. albiss. ʒj. cum decocto  
passularum fiat potus. Licet  
vti pil. elephanginis, de hiera,  
assaieret, vt sint harum alicu-  
ius ʒ2. agar. ʒi. & incorpo-  
rentur syrupotos. pallid. laxat.  
Laudantur quóque hæ pilulæ.

*Pilulæ Compositæ.*

℞. aloes lotæ in succo ma-  
ioranæ, qui ventriculum ro-  
boret, ʒj. agar. ʒi. mastichis,  
cinamoni, piperis añ. gr. 8.  
cũ succo absynthij formen-  
tur pilulæ. Alioqui:

**R.** Massæ interioris pilulæ  
 hieræ picræ Gal. ʒij. agarici  
 trochiscati ʒj. semi. carthami,  
 semi. vrticæ añ. ʒß. turpethi  
 benè gummosi ʒi. mastichis,  
 rosarum; cinamomi; galangæ  
 añ. Græ. vi. sacchari in vino  
 albo tenui dissoluti quant. suff.  
 cum oxymelite fiant duæ; lo-  
 zengæ pro duabus dosibus;  
 sumendis tertio. aut quarto  
 quóque die.

*Aliud.*  
**R.** pul. hieræ diacoli. ʒij. aga-  
 ricitrochil. ʒi. nucis moscha-  
 tæ & cinamomi añ. gr. 8. cum  
 syrupo de absynthio fiant pi-  
 lulæ.

*Pilule probatæ.*

Auicénas agarici ʒj. aut ʒ. ʒij.  
 corporat melli, aut eandem  
 dosim semi. vrticæ præcipit,

H. iiij.



datque breuibꝫ intervallicis.  
 Quæ sequuntur pilulæ, multis  
 probantur.

℞. pul. hieræ pictæ ʒj. agar.  
 trochif. ʒß. pulpæ colocynth.  
 ʒi. mastichis ʒß. nucis mos-  
 chatæ & cinamomi añ. Gr.  
 vj cum succo absynthii, for-  
 mentur pilulæ pro duabus do-  
 sibus.

*Alia.*  
 ℞. Agar albi, turpethi benè  
 gummosi añ. ʒ.2. Aloes, rhab.  
 corticum myrobolanorū ci-  
 trinorum, & Chebulorum añ.  
 ʒj. semi. cuscutæ & absynthii,  
 Eupatorii añ. ʒß. mastichis,  
 laccæ, anisi, sacchari albi, spi-  
 cæ nardi, glycyrrhiæ añ. gr.8.  
 Esulæ pulueratæ ʒj. cum oxy-  
 melite scyllitico formentur  
 pilulæ.

Conueniunt tēpore frigido

ad 3j. nec de his tamen recentibus vtendum est, sed post mensem.

Quæ sequuntur, caput & stomachum visceraque purgat, sensus acuunt, colorem reddunt, & diuturnam quotidianam sanant.

℞. Aloes optimæ 3iij. mastichis ʒ. 4. rosarum. Epithymi, Cariophyll. absynth. añ. ʒj. laccæ, Cuscutæ añ. ʒß. croci, Esusæ añ. Gr. 8. cum succo absynthij fiant pilulæ Dosis 3. i. ad 2. Dantur breuibus intervallis.

Simulatque apparebūt vrinae crassiores, & magis coloratae, stomacho consulendum est, per ea quæ postea dicentur.

Conueniunt fœtus ex oleo cham. anethi: iasmino, quibus totus venter fouendus, spina

inungenda est, idque cum frictione. Laudata est veteribus frictio ex telâ aranæ; quæ imbuenda est priùs oleis supra dictis.

Laudantur quoque diuretica. Balnea quóque in declinatione, sed néque frictionibus, néque diureticis, néque pharmacis, multò minus balneis vtendum est initiis febris.

Quòd ad clysteria & suppositoria attinet, vbi resistit aluus, imperari possunt. Comparantur ex eorum decocto, quæ incidunt, attenuant, & flatus discutiunt. Inflantur enim magna ex parte præcordia iis, qui quotidianâ laborant. Vomitus quóque maximè, vbi nausea est, & iis, qui faciliè vomunt, utilis est.

Post initia iam vacuat cor-

pore dantur hora antè accessi-  
sionem quæ sequuntur.

℞. theriacæ vel Mythridatij  
ʒj. propinetur ex vino tenui.  
Probaturn quoque decoctum  
apij, vel quod sequitur.

℞. zingiber, origa. anēos  
añ. ʒiij. Coriandri præparati  
ʒ4. rosarum, calamenti añ.  
ʒiij. passul. ʒj. coquantur in  
lib vj. aquæ ad cōsumptionem  
medietatis dantur ʒiij. horâ  
ante accessionem. Vitæ ratio  
institui debet ex iis, quæ co-  
gunt, attenuant, incidunt, &  
vt progreditur morbus, ho-  
rum vis augenda est. Vinum  
sit album, tenue, aut vermicu-  
lum, vel hydromeli vinosum.  
Abstinentum est multis ius-  
culis, quia nec decoctionem  
ita iuuant, & replent caput,  
nec stomacho amica sunt. Qui

H vj.

bus si vtimur, alterare oportet  
iis, quæ has noxas prohibeant.  
adultis auibvs vtédum est po-  
tiùs, quàm iunioribus, quæ sūt  
humidiores, & excremento-  
fiores.

*De febre quartanâ ex Fernel.*

*cap. 14. lib. 4. Pathol.*

Quartanæ febris continens  
causa censetur melancholia  
putris. Hæc enim quum pro-  
priis ex causis multa cumula-  
tur, nec caloris natui benefi-  
cio regipoteſt, quaſi deſtituta  
putreſcens, hanc febrem ac-  
cendit. Eſt autem Melancho-  
lia duplex, vna naturalis, quæ  
ſanguinis quaſi fex & limus  
eſt: altera aduſta, quæ vniuf-  
cuſque humoris torrefacti  
velut cinis eſt: hæc que aliàs ex  
bile ſlauâ, aliàs ex melancho-  
liâ exuſtâ fit: interdum ſed ra-

rius ex pituitâ aut sanguine per-  
 ruito. Hinc quartanarum alia  
 ex seipsa, non ex aliâ præce-  
 dente febre originem habet,  
 eâque ferè succedit lienis tu-  
 mori, quem naturalis melan-  
 choliæ exuperantia peperit.  
 Alia aliarum febrium vel con-  
 tinuarum, vel intermittētium  
 erraticarum soboles est, de  
 quâ dixit Hippocrates, inter-  
 pollata febris eadēque erra-  
 bunda in quartanam mutabi-  
 tur, præcipuè si autūnus pro-  
 ximus est: humor enim qui-  
 cūque priorem febrem ge-  
 nuit nisi integrè vacuetur, e-  
 xustus, crassiōrque factus, me-  
 lancholiæ naturam subit, pu-  
 trescēsq̃ue subiecta fit quar-  
 tanæ materia. Itaque eos in-  
 uadit, qui melancholicū hu-  
 morem congefferunt, cuius-

## DE FEBRIBVS

modi sunt lienosi, & qui vel adurentes, vel erraticas febres passi sunt non integrè solutas. Néque tamen in liene solo, sed & in mesenterio, & circū hypochondria exuperans melancholia coaceruari solet. Huic gignendæ apti sunt frigidi, & sicci, qui gracili; & glabro sunt corpore, ætate constante, vel iam inclinante: qui curis, & meroribus confecti sunt, cibis diu addicti crassis, terrenis, & omninò fœculentis. His melancholiæ copia succrescit, autumno præsertim, & regione coelique statu inæquali.

Quumque putredinis causæ aderunt, febris exquisita quartana accendetur. Accessionis initiū à frigore est valido, quòd cò vsq; sensim inualescit, dum

vehementem rigorem inuehat, non enim quidem, vt in tertianâ pungentem, feruentemque, sed verè contunderem, quo corpus vniuersum tremore concutitur, dentes strident; articuli verò, & ossa quasi pondere obteruntur, hoc ab eûte vomitio erumpit amara, quum præsertim viæ patet in ventriculum. Calor accenditur; non vt tertianæ vehemens, sed quàm quotidianæ ardentior: nèque is toto corpore æqualis est, sed cum quadam frigoris permistione, & permanente quodam artuum, & ossium dolore: sitis, vigiliæ, capitis dolor, reliquaque symptomata seuiora quidē, quàm in quotidianâ, mitiora quàm in tertianâ. Accessio quàm in cæteris intermittentibus lon-



gior, hancq; sudor finit, quàm in quotidianâ vberior.

Pulsus accessionis initio multò, quàm naturalis languidior minor, tardior, ac rarior: postea verò validus magnus, frequens, ac celer, & quàm in cæteris febribus inæqualior.

Vrina primis ferè diebus tenuis, alba, aquosaque: postea verò & substantiâ, & colore, & contentis, sæpè mutabilis, quòd eius materia plerùmque varia sit, eiusque modò minimum, modò plurimùm penetret in venas. Vix tota febris, nisi ex errore, ultra annũ prorogatur, soluitur, sæpè mensibus sex, interdum tribus.

*Curatio quartana febris ex Holl.*

*lib. 2. de morbis internis cap.*

*de febre quartana.*

*Cùm quartanâ clementer*

agendum est initio, neque medicamentis catharticis natura irritanda: Medicamenta quoque incidentia, & (vt vocant) digerentia media sint. Nam quicunque initio non solum catharticis, sed etiam fortius incidentibus, & digerentibus vtuntur, ex simplici quartana duplicem omnino maiorem, & difficiliorem, ex duplici triplicem, vel omnino ambas maiores, difficilioreque reddiderunt. Nonnunquam intempestiuo vsu remediorum continua fit, quę ægros occidit. Tempora igitur huius febris diligenter animaduertenda sunt. Neque vrina sola, sed omnia accidentia considerata sunt. Paroxyfmi inter se comparandi, videndumque an grauiora, an minora accidentia superueniant.

Verum quod ad pharmaca  
attinet, non perpetuo expe-  
ctanda sunt manifesta signa  
coctionis. Aliquando enim  
multa materia est corporibus  
neruosis impacta, sequitur-  
que paralyfis, cuius si qua o-  
stenduntur signa, etiamsi ma-  
nifesta coctio non apparet,  
minoribus remediis vtendum  
est. Neque leuioribus phar-  
macis, & clysteribus interdi-  
ctum est. Verum vt primæ venę lo-  
ulter repurgentur exhibebitur  
cassiae fistulae ℥ss. astate in sero  
caprino dissoluta: hyeme verò  
in hoc decocto.

℞. passul. p. i. foliorum sen-  
nae ℥j. Cinamomi, & seminis  
anisi añ. ʒss. fiat decoctio pro  
vna dosi, in qua dissolue vel  
cassiae vel catholici ℥ss. alioqui  
ex iusculo galli vel capi altera-

to: cum multâ boragine, buglossô, apio hortensî, lactucâ, scariolâ, infundimus, & cū nodulo incoquimus ʒij. foliorum sennæ, & iusculū colatum forbédum exhibemus: vel eadem folia liquidiore iure pisorum, aut cicerum rubrorum incoquimus, butyrum & modicum salis adiicimus, cinamomi etiam puluisculum, & ita damus. Eadem folia in puluerem reducta pondere ʒij. inspergimus decocti absynthij. ʒiij. frequens vsus veteribus fuit epithymi: Nunc folia sennæ plurimum vsurpantur. Iam apparentibus signis coctionis vtimur agarico, puluere hyerę puræ hi diac. quibꝰ folia sennæ trita cōmiscemus. Veteres etiã elleboro, quidam lapide armeno, & lazulî, fortioribꝰq;

catharticis, quę ex cap. de melancholia repetēda sunt. Quòd ad digerentia attinet conueniunt syrupi capill. veneris, de lupulis, scolopendrio, adiantho, violatus, de pomis, de fumo terrę, oxymel simplex.

Deinde etiam apparentibus signis coctionis, oxymel diureticũ, syrup. de bizatiis, syrup. de epithymo, Saboris, oximel scilliticum, alioqui melicrata ex absynthio, Eupatorio, chamædri, scolopendrio, radice capparis, fœniculi, petroselini, rusci, genistę, fraxinij, polypodij, tormentillę, tamarisci, glycyrrhizę, & similiũ. Aut ex his syrupos, apozemata comparamus, ferẽque passul. borag, cuscutam, icariolam, cichorium, quatuor semina frigida maiora, sem. anisi, fœni-

euli, carui, seminis portulacæ, coriandri commiscemus. Mel item passularum prius descriptum, aliquid aceti, decoctum limacum, ranarum viridium, succum pomorum odoriferorum, ex quo etiam syrupus cōcinnatur.

Sed in his omnibus diiudicandum : initio enim leuiora conueniunt, vbi néque fortiter calefaciendum, néque refrigerandum est: Eligendæque sunt, quæ vel temperata, vel proxima temperatis sunt. Vfus calidorū, cū iam viget morbus, & apparent signa coctionis manifesta, vt sudores, & vrinæ moucant.

Quòd ad phlebotomiam attinet, siquidem corpus sanguine crasso abundat, & redundat, si gracile corpus est, si

venæ turgidæ, si suppressa aliqua solennis purgatio, vena secanda est, satis amplo foramine facto.

Atque vbi niger & crassus sanguis effluit, pro ratione virium & multitudine sanguinis deplendū est. Si tenuis, & flavus, statim claudēda vena est, ferēque aperitur basilica sinistri brachij; vel saluatella, siue splenica vena; inter annularem, & auricularem sita, si quidem viribus metuimus. Atque aliquando periculi gratiâ, vt qualis sit sanguis, cognoscamus, vena inciditur.

Suppressa purgatio suo modo incitāda est. Est & in quartanâ thermarū & balnei vsus. A balneis (inquit Gal. lib. i. ad Glauco.) penitus arcendī non sunt, à quibus si omninò ab-

stineant, solis contenti frictio-  
nib<sup>9</sup> plurimùm iuuari possunt.  
Galen. videtur omninò reii-  
cere, nisi consuetudini aliquid  
concederet. Hippocrates, &  
Arabes recentiorésque practi-  
ci hoc modo vtuntur: ante si-  
gna coctionis dulcia quidem  
balnea, leuiter calfacientes  
thermas, vt brevis mora sit  
permittūt. Idq̃ue antè cibum,  
obstructionis metu, extraq̃ue  
paroxysmum, vt die accessio-  
nem præcedente, apparenti-  
bus verò manifestis signis co-  
ctionis fortiora balnea & stu-  
phas permittunt, eadēque  
frequentiora. Quorum ista ra-  
tio esto; Nam in quartanâ per  
initia quidem, omnis motus  
corporis, & animi, q̃ quidē ve-  
hemens sit, vitandus est. Po-  
steà verò is conuenit siue fiat



per pharmaca, siue per potiones, & alia quæuis remedia. Debent autem & thermæ, & balnea ex dictâ materiâ comparari, gratiâ exempli, chamæmelum, melilotum, anethum, herba fæniculi, postea etiam calamentum, melissophylum, pulegium, stæchas, origanum: coquantur aquâ vnde lauacra fiant, & vapor thermarum excitetur.

Iam apparentibus signis coctionis, à thermis, & balneo tempestius vsus est Theriacæ. Quartanarios ( inquit Galenus ) multos sæpe hoc ordine curari: eo die, qui accessionem præcedit, vomitum à cœna commouî; postridie mane cremorem absynthij exhibui, tum duabus horis ante accessionem, theriacam dedi, id quæ tam

tam feliciter cessit, vt postea non redierit accessio. Hoc modo igitur ex Galeno, Arabibus, & recentioribus Medicis in quartanâ te habebis. Vbi iam apparent signa coctionis manifesta, pridie accessionis ex decocto feminis atriplicis, vel raphani ad ℥v. vel vj. datâ aquâ, vel ptisanâ tepidâ digito immisso in gulam, pennâ illita oleo vomitû à cœna commouebis. Stomachum oleo absynthij inunges, somnum in noctem procurabis mane.

℞. Summitatum absynthij m. ℥. fiat decoctio in aquâ ad ℥iij. colatura detur, quæ modico cinamomi condiri potest: ex quo duabus horis ante accessionem.

℞. theriacæ bonæ & antiq. ʒj. vel ʒij. diss. in vino albo

tenui ad ℥iij. in quo calido chamædreos pugillus maduerit: alij etiam initio paroxysmi eundem potū imperant: hocque meminisse oportet, eum diem qui præcedit paroxysmū commodissimum esse & pharmacis, & allis remediis.

Alia quóque antidota interuallis sunt danda, multò magis vbi manifesta signa coctionis apparent.

Pluribus vsus theriacæ, myrridatij, auræ alexandrinæ dosis à ʒj. ad ʒij. ex vino, decoctione chamædreos, aqua ligustici (quæ ad stomachi inflationes præcipuè valet) cuscutæ, scolopendrij, fumaris, lupulorum, capill. venc. Valerianæ, calamenti, & rerum similibus. Probatum quóque & hoc.

℞. Cinnamonij zj. piperis 3j, croci, myrrhæ, styracis, sagapeni añ. 3ß. benzoini ziiij. rad. gentianæ zij. excipiantur melle. Dosis 3ß. aut ʒij. ex aquâ calidâ. Eadem dosis castorei, vel bituminis Iudayci. Dantur autem duabus horis ante paroxysmum. Lotus & illitiones non solû stomachi, sed & viscerû, lienis, præsertim, primum quidẽ ex iis q̃ remolliũt, & relaxât: deinde additis quæ flatus discutiunt, & aperiunt. Conuenit oleum chamæmelinum, aneth. absynthij adduntur & semina apij, ruthæ, Cuminum.

Solemne fuit veteribus medicis, obseruatum quóque recentioribus, vt præter supra dicta remedia, quæ antè paroxysmum descripta sunt, spi-

nam, scapulas, brachia quóque inungerent, imminēte febre. Cui rei conueniunt oleū chamamelinum, de cucumere agresti, oleum in quo rosmarinus coxerit, & eaquæ in paralyſi dicta ſunt ſic enim præcidi-  
tur cauſa paralyſeos, quæ aliquando quartanariis accidit, ob craſſos humores neruis im-  
pactos. Deinde rigor anteuer-  
titur. Probatum hoc limen-  
tum.

℞. ſucci ruthæ ℥ij. olei ſcor-  
pionum ℥iiij. vini maluatici  
℥iiij ferueſcāt ad ſucci conſum-  
ptionem, & addito ceræ mo-  
mento fiat limentum.

*Aliud.*

℞. Cinamomi, piperis añ.  
℥ij. terantur tenuiſſimè & mi-  
ſceantur: & poſtquàm ſpinam  
oleo chamemælini iuxeris, pul

uerē in ſpergito : ſequentibus  
paroxyſmis idem & in ſcapu-  
lis & brachiis facito.

Post hæc autem, quæ fieri  
debent imminente paroxyſ-  
mo, molli lecto ægrum repo-  
nito, benè contegito, lateres  
calidos perſuſos vino tenui  
odorifero, & linteolis con-  
uolutos plantis pedum & vo-  
lis manuum, admoueto, vela-  
liter cōtra frigus munito. Iam  
vigente morbo vrinæ, & ſu-  
dores moueantur. Cui rei me-  
licratum è chalamento mulſa,  
in quâ anethum, rutha, & ſimi-  
lia coxerint: gajaci decoctum  
conuenit.

De vomitu ſi habeto. Qui  
iſagogem ſeu Medicum ſcri-  
pſit, initio paroxyſmi extrema  
calfacit, in remiſſione vomitū  
prouocat. Græci à coena vo-

mitum ferè imperant.

Auicēnas antè cibum, post cibum, horâ ante paroxysmū, initio paroxysmi. Præctici recētiores initio vomitum pro-uocant, & antè paroxysmum. Commodissima hora est com-motâ materiâ & facilè sequen-ti. Id fit initio, & remissione paroxysmi: fit etiam iam coe-natis.

In clysteribus eadem ratio seruari debet, quæ in pharma-cis. Primùm enim ex remol-litius vocatis, adiecto furfu-rum cremore, prunorum & passul. decocto. Postcà verò vbi materia cœpit concoqui paulò acriores clysteres con-ficimus: dissoluimus autem ini-tio quidè cassiam fistulam. denique etiam cum materiâ decoctionis epithymum, folia

fennæ incoquimus ad ʒij. vel  
iij. hyeram picram dissoluimus  
ad ʒβ. vel Galeni, quæ lenior,  
vel Oribasij, quæ acrior, cuius  
hæc est descriptio.

℞. Aloes ʒij. & Gr. vj. spicæ  
nardi, asari: mastichis, croci,  
xylobalsami añ. gr. 9. corticis  
radicis ellebori nigri ʒβ. te-  
rantur omnia, incorporentur  
ex decocto pulegij, vel succo  
absynthij, alioqui melle vt gra-  
tiora sint. Dissol. autem huius  
picræ melle incorporatæ ʒij.  
vel ʒβ. quâ & vti licet iam pro-  
gresso morbo ad ʒj. ʒiiij. si inde  
formentur pilulæ.

Alioqui imperabis pulu. hyc-  
ræ picræ ʒj. pul. fennæ ʒβ. in-  
corporabis ex succo absinth.  
in quo ʒβ. corticis radicis el-  
lebori nigri madefeceris.

Quòd ad victum attinet con-



uenit initio è materiâ mediâ,  
 interuallis quóq; ab initio ad  
 vigorem rebus acribus, vt si-  
 napi, & pipere, & salsamen-  
 tis vtilicet.

Quamquàm & post vigorem  
 tempestiuus vsus est. Similiter  
 diatriũ pipereon, diaspoliticũ  
 ad ʒij. ex ʒiiij vini vel maluati-  
 ci, vel tenuis & odoriferi, idq;  
 ante paroxysmum. id autem  
 fiet commodè, vel tertio, vel  
 quarto quóque die. Salsamen-  
 tis veterum ferè caremus, né-  
 que, vt salsamenta Græcis &  
 Arabibus permittuntur, qui-  
 bú suis rebus sale conditis, v-  
 tendum est. Non enim bubu-  
 lâ aut suilla, non iethiocola seu  
 molluta, in summâ iis quæ  
 crassum sanguinem gignunt,  
 quæ minimum ficcant, quæ  
 viscidam materiam relinquūt,

vti oportet. Nam ideò fassamenta imperantur, quia sal incidit, attenuat, discutit excrementa, siccant, virtuem colligit, & roborat.

Vitanda sunt quę refrigerāt, & siccant, nisi temperentur aliquo quòd humectet. Siccant capillares & refrigerant, scolopendrium, & alia, quibus hic vtimur. sed aliis, vt saccharo, & aquā corrigantur. Refrigerantia verò & humectantia prohibet ex Græcis Aëtius.

Auicennas permittit iusto modo, vt scilicet, facilis sint coctionis, boni chymi, quantitate modicā, & si quidem nihil metuiamus, ne inde vis concoctrix ventriculi offendatur, tūmq; corrigenda sunt. Numerat lactucas, Endiuia,

melones, persica. Meliùs fuerit vti persicis cōditis, cerasis, & eiusmodi fructibus æstiuis, qui saccharo condiri solent, & ita seruari: alioqui persica coquantur si recentia sunt, nec condita. Cerasa duobus vasis conclusa cum modico vino macerantur. Saccharū inspergitur: ita prodesse possunt, nec nocent. Vino quòque contra errorem multorum persica infundi possunt, nam hoc à vino accipiunt, quòd & inde frigiditate temperantur, nec faciliè corrumpuntur.

Lactuca, & endiuia leuiter feruefiant ad acetariam parandam. Saccharum inspergatur. Probātur conseruæ violarum, rosarum & bōraginis. Sed perpetuò distinctio adhibēda est, vt in usu horum omnium re-

mediorum rationem ineamus naturæ, materiæ ægri, coeli, regionis, & reliquorum eiusmodi.

*De Compositis febribus ex Fernel.*

*cap. 15. lib. 4. patho.*

Simplex & exquisita febris ex vnius simplicisque humoris corruptione proficiscitur, & eius omnes causæ, omniâq; signa, nempe natura, ætas, victus ratio, regio, anni tempus, & status cæli, omnia denique symptomata in vnius eiusdemque humoris dominium conspirant. Composita autem febris bifariam dicitur, vel quòd ex multis confusis, vel quòd ex implicitis constet. Confusæ sunt, quæ ita permiscentur, vt simul incipiant, simulque desinant. Fiunt autem ex diuersis humoribus eodem loco, per-

mistis, atque confusis, pariter-  
 que putrescentibus. Nulla se-  
 orum internosci potest, neq;  
 vlla simplex ac pura elucet, sed  
 sunt earum signa confusa. Hæ  
 sunt quas suprà febres nothas  
 appellauimus. Quum par est  
 confusarum modus, vix vl-  
 lum potest, definitum genus  
 signari: quum verò impar, con-  
 fusa febris eius quæ plus pollet  
 potiórque est, genus nomén-  
 que sortitur. Quæ plus bilis  
 putrescentis quàm ceterorum  
 humorum nacta fuerit, tertia-  
 na appellabitur, sed notha ac  
 illegitima: & quotidiana no-  
 tha in quâ non syncera pitui-  
 ta, sed alterius quippiam hu-  
 moris vnà putrescet. Quarta-  
 na notha in quâ melancholia  
 aliis etiam humoribus perfun-  
 detur. Implicitæ febres sunt,

quæ diuersis horis incipiunt, diuersisq; definunt. harum vnâquæque seorsum consistit, propriâmq; essentiam habet, tametsi accessionû partēs quædam in tempus idem concurrunt. Fiunt hæ ex diuersis humoribus non eodem loco positæ, sed quorum sua sit cuiusq; sedes, sua essentia, suûsque motus: harû vnâquâmq; tanquam seorsim atq; solitaria consisteret, minimè arduum fuerit propriis signis interno-scere. Cōtinua cū continuè duntaxat confunditur, non autem implicatur, & absurdū est quòd scribit Auicennas, vnus continuæ putredinem ex vno loco, alterius ex altero effundi: nam reuera in vtrâque humores in venis putrescunt maioribus, in hisque agi-

tati permiscetur. At intermittens tum cum altera intermittente, tum cum continuis implicari solet. Quùm itaque tres sint omnes simplices intermittentium differentiæ, Quotidiana, tertiana, & quartana, harum vnaqueque cum alterâ, vel eiusdem vel diuersi generis implicari potest, ex similibus generû implexu hæc fiunt. Duplex quotidiana, cùm in dies accessiones duæ typis definitæ contingunt, quod admodum insolens est. Duplex tertiana frequens obtingit, cuius accessiones quotidie fiunt, sed nec pares, nec iisdem horis: ferè enim quæ diebus imparibus fiunt accessiones, similes inter se sunt, atq; iis dissimiles quæ in dies pares incidunt. Duplex tertiana à sim-

plici ferè initium habet, cui dein accedit & altera, & implicitarũ vna prior terminari solet altera manente.

Non minùs frequens est duplex atq; etiã triplex quartana: illa duobus dieb<sup>9</sup> exercet, vno intermittit: hæc quotidie accessiones habet, easque rarò pares. Vtráque solet è simplici nasci, cui dein altera, postea verò & tertia ad illas se applicat. Has omnes à quotidianâ typus distinguit, quòd sint quotidianæ similes inter se accessiones: harum verò dissimiles. Et licet similes fortè contingant ex mouendi tamen impetu & ex commemoratis signis internosci possunt.

*De Tertianâ ex Fernel cap. 13.*

*lib. 4. Pathol.*



Tertiana notha aliàs ex vitellinâ bile in ventriculo putrescente, ac inherēte firmitus, aliàs ex permistione bilis, atq; pituitæ gigni solet. Atque hæc non omnes bilis, sed quasdam etiam pituitæ causas habet evidentes.

Accessiones nullo anticipationis cūctationisue certo ordine recurrunt, néque si statæ sunt, exquisita propterea debet illa censerī: non enim ex circuitu solo, febris essentia spectatur; rigor minùs quidem vehemens, sed diuturnior, calor minùs pungens, minùsque vehemens, qui nō inæquabilis omne corpus inuadit, non ab- similis igni ex mistis virētibus, siccisque lignis succenso. Ardoris symptomata omnia mitiora, quòd bilis furorē pituita

reftinguat : hinc etiam pauco,  
nec admodum calido fudore  
inclinat. Accessio vltra horas  
duodecim multum exporrigitur,  
quantò que longior fuerit,  
tantò impuriòr: numquam fe-  
ptem, rarò quatuordecim cir-  
cuitibus iudicatur : sæpe verò  
longiùs excurrit.

*Curatio tertianæ nothæ ex Holl.  
lib. 2. de morb. inter. cap. de  
tert. Nothæ.*

Clyfteribus primùm non  
ita mollibus vtédum est, dein-  
de leui pharmaco, vnde primæ  
venæ repurgentur. Postea cō-  
fentientibus numeris, phlebo-  
tomia è basilica dextra. Aui-  
cennas post tertium vel quar-  
tum paroxyfimum, venā ape-  
rit dextram æftate, hyeme fi-  
niſtram.

Viçtus aliàs parciør, aliàs  
 plenior vt breuitas vel lon-  
 gitudò febris expectatur :  
 Nam in longis pleniùs nutri-  
 mus ; in celeribus parciùs.  
 Viçtus sit incidens, & abster-  
 gens, coctu facilis. Vrinæ  
 sudores paulò calidioribus  
 quàm in tertianâ moueantur.  
 Iam apparentibus signis co-  
 ctionis, Gal. hordeatis aliquid  
 piperis adiecit, Amygdalino  
 lacti aliquot amygdala amara  
 commiscere licet, alioqui a-  
 mygdala dissoluẽ in decocto  
 rhei, quæ incidat & detergeat.  
 Græci mulsæ utebantur, in  
 quâ hyssopus ferbuisset, aut  
 aliquid tale, quòd videli-  
 cet sine insigni calfactione, &  
 exsiccatione urinas ducat, qua  
 lia sunt spica celtica, cinamo-  
 mum, radices apij hortensis,

semina anethi, foeniculi, comæ  
 absynthij, sed quæ, cum ad-  
 stringant, non tam ad mouen-  
 das vrinas, & sudores, quàm  
 ad ventriculi robur, & biliosi  
 humoris euacuationē faciunt.  
 Oxymel quóq; conuenit con-  
 ditū aliquo aromate vt spicâ,  
 vel cinamomo, puluis hyssop-  
 i, menthæ, calamenthi, stæ-  
 chade.

Potiones autem dilues, ma-  
 gis aut minùs pro ratione fe-  
 bris, materiæ, quæ febrem fa-  
 cit, temperamenti, ætatis, tem-  
 poris, & similium. Iam ferè  
 paratur hydrosacchar. ex lib. i.  
 aquæ coctæ colat. per mani-  
 cam hippocr. cum ℥iij. sachari  
 & 3ß. cinamomi, vel 3j. Vete-  
 res loco hydrosacharæ mulsâ  
 utebantur. Nunc verò in fri-  
 gidiore conditione, loco sa-

chari; melle albo vti licet, vel partim saccharo, partim melle albo. Vbi iam apparuerint signa coctionis, molliter subducenda alius est, ex iis, quæ postea dicentur.

Non omittendū quòd Hippocrates primū, deinde Galenus, & Auicennas annotauerant, vomitum à cibo tam efficacem esse in hac febre, antecedentem morbi causam vacuando, v̄t hoc vno remedio permulti conualuerint.

Historia est apud Hippocr. de vxore Theotimi, quam mulso succo granatorum percurauit, inde vomitu citato. Licebit itaque vti oxysaccharâ tepidâ, vel oxymelite simplici, cum aquâ tepidâ, in quâ sex rotulæ raphani coxerūt, statim à cænâ. Alioquin

℞. hydromel. ℥ij. decocti  
hyssopi ℥ijß. detur tepidum à  
cœnâ.

Nostra ætas non feret tenuem victum, quem veteres, tantum tertio quoque die ægrum nutriendes, præscripserunt. Nutriemus itaque, ut semel in die comedant, remissionis vel intermissionis tempore. Vino tenui uti licet extra accessiones. Pullus iam satis adultus in aquâ coctus, cū boragine, cerephyllo, oxalide, petroselino, hyssopi modico: Coques autem ad putrilaginem, & si vis, iusculo sacchari aliquid iniicies, ut lœui vitellum omphacino dissolutum. Hordeato, & lacte amydalino vteris; sed benè conditis saccharo, vel melle albo: ptisanâ vulgari, in quâ anethi coma,

# DE FEBRIBVS

aut aliquid seminis eius , apij  
foeniculi, spicæ, cinamomi, pi-  
peris maduerit vti oportet: aut  
in eâ octauam partem saccha-  
ri, vel mellis albi liquefacies.  
Poterit imperare hanc ptisa-  
nam.

℞. hordei mundati quart. i.  
hyssopi, glycyrrhiæ mūdātæ,  
añ. ʒß. Iniubarum, passularum  
mundatarum, cicerum rubro-  
rum añ. ʒj. fiat decoctio in  
aquâ purissimâ ad lib. ij. Cola-  
tura transfundatur per mani-  
cam hippocratis cum ʒiiij. sac-  
chari fiat ptisana clarificata, &  
aromatizata cum ʒij. cinamo-  
mi; vel mulsæ, vel hydrosacha-  
parabitur ex aquâ, in quâ pu-  
gillus spicæ celticæ, aut stæ-  
chados efferbuerit.

Materia clysterum, quibus  
interuallis vtendum est, fur-

fures, hordeum, chamæmeli,  
Melilo. absynt. anethi coma,  
beta, scariola, ficus pingues,  
additâ etiam lactucâ, portula-  
câ, acetosa, si refrigerandi cõ-  
filium est.

Quòd si alius sit durior, ad-  
denda sunt remollientia. In  
decocto ad lib. i. olei commu-  
nis, aut chamæm. ℥iij. mellis  
communis ℥ij. dissolues. Non-  
nunquam etiam vel Cathol.  
℥vj. vel diaphcæn. aut Benedi-  
ctæ ℥β. Suppositoria acuan-  
tur, cum ℥ij. hyeræ picræ, &  
℥j. salis gemmæ. Purgationes  
conueniunt ex Rhabarb. mix-  
tâ parte agari. trochiscati, v-  
triúsque ℥ij. Catholici ℥vj. in-  
corporentur. Alioqui paupe-  
ribus imperabis ℥vj. Cathol.  
℥ij. diaphcænici cum hydro-  
melite vel diaphcæni. ℥ij. agar.



ʒj. cum hydromel.

Quòd si ab infirmitate ventriculi metuatur.

℞. pulu. hieræ picræ recentis, rhabarb. electi torrefacti, & subtiliter puluerati añ. ʒij. incorporentur ʒiij terebinthinæ fiant boli cooperti auro, vel nebulis, vt faciliùs transglutiantur. Laudatur pilulæ de Rhabarb. maximè autumno, de Eupatorio.

℞. Aloes, Rhabarb. myrobol. citrinorum, succi agrimonie añ. ʒß. vniantur cum succo Endiuie, aut fœniculi. Laudatur trifera Sarracénica sine scammonio. Syrupi imperandi oxymel simplex, oxyfacherum, syrupus acetosus, de scolopen. capillorum veneris, dilutum cuscute, cichorij, absynthij, cicerũ rubrorum, sed diluta

diluta faccharo, & tantillo Cinnamonomi condienda sunt: maximè probatur fyrupus de Cichoriò cōpositus, qui etiam Catholicus est, & ad omnes humores valens, datur ad ℥ij. Nonnumquam quia metuitur ne degeneret in quartanam, imperamus dessicandis humoribus & aperiendo, quale hoc est.

℞. summitatum lupuli, cicho. añ. m. ℞. rad. apij. petrosi grami. añ. ℥℞. sem. melonum, cuscutæ, anisi añ. ℥i℞. glycyrrhizæ razæ ℥j. fiat decoctio ad lib. ℞. pro dosibus duabus. Incolat. diss. fyrup. de bizantiis & capilli veneris añ. ℥i℞. fiat apozema clarificatum, & aromatizatum cum tantillo cinnamonomi, vel puluere diarrhodi abbatis, vel triasantali.

*Aliud.*

℞. rad. petrosel. acetos. gramin. añ. ʒß. feminis anisi & fœnicu. torrefacti; liquiritiæ añ. ʒiß. summitatum lupuli, fumariæ, cichorij cum toto añ. p. i. trium florum cord. añ. p. ß. fiat decoctum ad lib. ß. in colatura dissol. capill. veneris ʒij oxy melitis simpl. ʒj. fiat apozema, vt prius pro duabus dosibus, tempestius vsus erit tempore remissionis febris. ab his verò cathartica imperanda sunt, quale hoc est.

℞. Pass. mundat. hordei integri añ. ʒß. cinam. Santali citrini añ. ʒj. Violarum p. j. fiat decoctio pro vna dosi, in quâ infunde Rhabarbari electi ʒij. expressioni colatæ adde syrupi de Cichorio simplici ʒj. fiat dosis.

*Aliud.*

℞. hordei integri p. i. sum-  
mitatū lupuli, & absynthij, Ci-  
chorij, Eupato rij añ. p. β. semi-  
nis melonum, & Cucumer.  
añ. ʒβ. Stechados arabic. ʒi.  
foliculo. sennæ mundatorum  
ʒiij. fiat decoctio ad ʒiiij. In-  
colat. infunde Rhabarb. electi  
ʒiiij. agarici trochisc. ʒβ. ex-  
pressioni adde sacchari albiss.  
ʒβ. vel, vt purget efficacius sy-  
rup. laxat. ros. pallidarum ʒj.  
Santali citrini & cinamomi añ.  
ʒj. Probatum inunctio hypo-  
chondriorum ex oleo de cy-  
doniis, de absynthio, chamæ-  
melino, anethino, & aliis quæ  
stomachum corroborant. Bal-  
neum quóque probatum anti-  
quis post signa coctionis. Sed  
iam vsus exoleuit, & perit in-  
dustria parádi, quæ suspectum

DE FEBRIBVS  
auxilium reddunt.

*De semitertiana febre ex Fernel.  
cap. 15. lib. 4. Pathol.*

Semitertiana febris, constat ex tertianâ intermittente & ex quotidianâ continuâ: vnóque die accessiones duas habet, altero vnicam. Si pares ambo sunt humores, exquisita fit semitertiana: Si verò bilis exuperat, ardentior fit & tertianæ magis affinis: Si pituita, mitior magisq; quotidianæ particeps. Quotidiana intermittens, si quando tertianæ continuæ iungatur atque implicetur, semitertianam quóque efficiet, càmque exquisitam. & nunc dictæ persimilem, si humores ipsi æquales concurrant: non exquisitam verò, exuperante eorum alterutro,

*Curatio febris semitertianæ ex  
Holl. cap. de Semitertiana  
lib. 1. de morb. internis.*

Eadem ferè curatio quæ tertianæ nothæ, nisi quòd in semitertianâ maior pituitæ ratio habenda est. Itaque descriptâ curatione quotidianæ, & repetitâ, quæ in tertianâ dicta est, semitertianæ curatio fiet manifesta.

*De febre Epiala ex Fernel.*

*cap. 12. lib. 4. Pathol.*

Epiala febris est, cum in quavis corporis particulâ eodem tempore calor frigusque percipitur, & vnaquæque corporis pars rigore febreque iactatur. Huius causa putatur acida, vitreâque pituita leuiter putrescens, & cuius portio incensa iam est. Altera verò necdum putredinem experitur.

Eos autē qui in dignotionem februm diligentius incūbunt, hoc in primis loco moneri velim, & cōtinuas ( quæ biduum tridūmve quādoque occupant ) & intermittentes omnis generis variè admodū inuadere. Sæpè quidem in horrore, atq; rigore tū interiora, tum externa summè frigent. At nonnunquam interiora frigore perhorrescunt, aut rigēt, cū tamen partibus externis non frigus, sed calor vnus æquabilisq; deprehenditur. Nonnunquam partes summę, externęq; frigent, interiores verò vruntur ac sitiunt, potūque in horrore cōtinenter expostulant. Tantæ autem varietatis causa, non ad vitream acidamue pituitam reuocāda est, sed eo sanè quòd impulsa fe-

bris materia, dum præcordia feriens horrorem parit, partium externarum calorem alias reuocat intrò, alias non reuocat: alias quòque horroris materia acris salsaue non paruum sitim infert.

*Curatio febris Epialæ ex Holl.*

*lib. 2. de morb. intern. cap.*

*de febre Epiala.*

Hic abstinendum phlebotomiâ: medicamentis incidentibus, & calfacientibus vtendum est, vt hyssopi, calamenti, origani, thymi, stæchados, melicratis, quibus quarta pars vini poterit commisceri; alioqui syrupis vti in curatione quotidianæ descriptis, initio factò à leuioribus, vt syrupo acetoso; oximelite, ad fortiores, vt oxymel compositum, scilliticum & similes.

K iiij



Iam incisa, & concalfactâ ex parte materiâ, vtendū erit medicamento ex puluere hieræ picræ Gal. pulu. hieræ diacolo. añ. ʒß. videndūmq; erit, vt recentes sint, & electæ species, ex quibus pulueres componuntur. Post purgationem redeundum est ad incidentia medicamenta & alimentâ atque interuallis, glandibus & clysteribus acrioribus vtendum, in quibus pulueres proximè dicti dissoluuntur ad ʒß. Probant thermas siccas, vbi iam se produnt signa coctionis. Meliores thermæ, si ex rebus incidentibus, & calfacientibus comparentur. Itaque calamentum, mentam, origanum, rosmarinum, thymū, satureiam, stœchada, & alia eiusmodi; quatuor partibus

aquæ , ( & vnâ vini albi ; in fine decoctionis positi ) incoquemus, atque inde pro ratione virium, thermas comparabimus. Valent statim à thermis diatrium pipereon, diacalamynthes, aurea Alexandrina, Dianthos, & similia data ex vino tenui Dosis ʒj.

Poterit quóque his vti tempore matutino, Sed optimum fuerit statim à thermis fricari corpus, sed spinam maximè: Deinde inungi oleis suprâ numeratis cap. de quotidianâ, aut iis, quæ cap. de paralyti scripta sunt. Post hæc reponatur in molli lecto, & sumptis diatrium pipereo, vel simili, conquiescat.

Vitæ ratio eadē quæ in quotidianâ, sed attenuet magis, & incidat.

*De febre Lipyria ex Holl. lib. 2. de morb. inter. cap. de febre Lipiria.*

Quæ sit hæc, non satis conuenit. Gal. libel. de inæquali intemperie cap. ij. in eo genere reponit, in quo propter magnitudinem internæ inflamationis, & malignum humorem interna ardent, externa refrigerantur. Id quòd in medijs corporis inflamationibus contingit: Nam internus calor instar cucurbitulæ calorem externarum partium intrò attrahit. Aëtius lipyriam putat, quæ sequitur Erysypelas ventriculi. Arabes pituitam crassam & viscidam, aut eiusmodi bilem collectam in primis venis, & calorem vnà cum vaporibus suffocantem, ne videlicet, calor dispergatur in corpus, causam faciunt huius febris. Alia

quóque parùm verisimilia de hac febre prodiderunt.

*Curatio ex eodem Holl.*

Lipyria Græcorum primùm. quidem phlebotomiâ, deinde refrigerantium vsu, vt lactucæ ex aceto diluto, ac iam vigente morbo, largo haustu frigida aquæ curari debet.

Cataplasinata ex hordeaceâ farinâ subactâ, cum succo semperuiui, & similiũ hypochondriis applicentur, subinde cõmutentur.

Arabes syrupo acetoso, oxymelite materiam crassam incidunt, postea etiam oxymelite diuretico, sed perpetuò incidentibus aliquid admiscunt, quod stomachum roboret, vt syrupum rosatum, de agresta. Quòd perpetuum est in febribus phlegmaticis, vt. cùm

K vj

# DE FEBRIBVS

incidimus, stomacho etiam  
consulamur. Deinde purgant.

Purgatio ex Aloë, hierâ,  
Rhabarbaro. Interim incidūt,  
vomitum cient, clisteres acres  
imperant, vtuntur attēnuante  
victu, eo modo stuphis & su-  
doribus vtūtur, deinde etiam  
antidotis, quomodo in Epialâ  
dictum est.

*De febre pestilenti ex lib. Iul.*

*Palmarum de peste cap. I.*

Λοιμὸς, seu λοιμώδης πυρετός  
Græcis, pestilentia seu pestis  
Latinis, febris est peracuta, cō-  
ragiosa, venenata, populariter  
grassans, multos perimens,  
bubone & carbunculo, aut e-  
xanthematis comitata. Pestis  
quidem febris dicitur, propte-  
rea quòd calor est præter na-  
turam, in corde accensus, isq;  
venenatus, qui celeri, frequēti,

& inæquali pulsu se prodit; nisi fortè deuicta natura ipso morbi initio succubat. Tum quippe aliquando rarus, paruus, & languidus, semper tamen inæqualis, & inordinatus pulsus deprehenditur.

Quamquam autem hippocr. sententiâ duo sunt febrium genera, quorum alterum commune omnibus, pestis appellatur: alterum propter malam victus rationem, priuatim his contingit, qui eâ vtuntur: quoniam tamen febres verè pestilentes non vt reliquæ vehementi caloris incendio, sed venenata pernicië, idque citra magnum & vehementem pulsum maximè vrgēt, & afficiūt, idcirco nonnullis visum est, quosdā in peste penit<sup>9</sup> sine febre esse, aut febre admodū ob-

- scurâ detineri: quum tamen reapse febricitet omnes: etiâ si cōplures prius intereât, quàm venenatus calor cordi insidēs, in vniuersas corporis partes fuerit effusus: quia scilicet prius vitale corporis robur infringit, quàm manifesta sui symptomata exhibeat.

Pestem igitur febrem esse in confesso est, peracutam verò esse, rei euentus comprobatur. Sæpe enim primo statim aut secūdo die iugulat, septimum, si simplex & legitima existit, vix vnquam prætergressa. Quū verò putridæ cōstitutioni implicatur, etsi non ita præceps esse solet, vix tamen decimum quartum diem superat. Popularis dicitur, quòd multis communis, populariter in obuios quosque nullo delectu sæuiat.

Contagiosa, quòd eius virus  
ab vno in alterum permeet.

Maligna, quòd morborum  
omnium, qui vel ab intempe-  
rie, vel obstructione, vel sim-  
plici humorum putredine cō-  
trahuntur, naturam & perni-  
ciem superet, quòdque eorum  
remedia omnia contemnat,  
iis duntaxat cedens, quæ ve-  
teres, quia venenis resistunt &  
aduersantur, alexipharmaca  
seu antidota dixerunt.

*Vera & legitima pestis pathogno-  
monica signa ex lib. palm. de  
peste cap. 8.*

Vis pestifera quodcunque  
corpus occupet, propria sem-  
per edit signa, & peculiaris suę  
malignitatis notas profert, qui-  
bus se prodatur: at præter has  
quum in corpus irruit, spiriti-



bus & humoribus ad putredinem excipiendam paratis refertum, alia multa symptomata infert, aliis ex putredine morbis communia, quæ illius propria signa obscurant, cognitionemque interturbant.

Quoniam igitur nullius febris curatio rectè institui potest, antequam simplex ne ea sit, an diuinum quiddam habeat perspectum sit, præstat peculiaria veræ & legitimæ pestis signa seorsum tradere, quibus illam ab ardente, aut aliâ quauis putridâ febre exercitatus medicus nullâ cunctatione distinguat. Pestilentiaë causam vnâ cum spiritu hauritam per pulmones rectâ cor appetere, primûmque in ipsam vitæ arcem & propriam caloris insiti ac vitalis spiritus

fcaturiginem impetum facere, medicis omnibus . receptum est. Cōstat & illud quū primū cor venenata aëris inspirati labe perculsum est, omnes vires suas colligere, quo se ab infensissimo hoste vindicet atque tueatur. Hoc igitur si præparatum est, venenōque excipiendo opportunum, néque satis obsistere potest, & perniciem propellere, statim contaminari afficiq̃ue necesse est, nec multò potest arteriarum spiritus; postremò humores, vniuersumq; corpus pestilenti labe pollui.

In hoc conflictu pulsus qui certissimus esse solet, affectio- num cordis nūcius, nunc obscurus, frequens, & intercidēs, quum venenum cor cōculcat ac comprimit, nunc plenior &

firmior citra tantam imbecillitatem, quum cordis robur alimento aut medicamento cardiaco vegetius factum, in venenum insurgit, illudque superare & propellere nititur. Sic affecto oblæsoque corde membrorum validissimo ac nobilissimo, vires omnes corporis, sed præcipuè vitales statim infringuntur & e-languescunt: vnde arteriarum pulsatio multo quàm in aliis febribus exilior & imbecillior, magisque inæqualis atq; inordinata comparet, non tamen semper, vt in aliis febribus frequentior, & celerior. Magna igitur pulsationis arteriarum inæqualitas, cum ipsius imbecillitate atque reliquarum virium infirmitate coniuncta, statim assiduæ febris initio

cùm appareret , si pestilens est  
cæli status, pro. fidissimâ pestis  
notâ iurè habeatur. Multò cer-  
tior coniectura fuerit , si citra  
causam manifestam frequens  
syncope territat si assidua vr-  
get vomitio , aut nausea, aut  
cardiogmos. His enim ventri-  
culus cordi affecto cōsentiēs,  
vt cor obscurâ , inæquali , &  
inordinatâ pulsatione, efficiē-  
tis causæ malignitatem prodit.  
Quanquam autem inæquali  
pulsu febrem inesse iudica-  
mus, eamque periculosissimâ:  
hac tamen ægrotus, quoniam  
nec ardoris incendio terretur,  
nec siti molestâ premitur , se  
teneri pernegat: febris nihilo-  
minus proprium signum cùm  
insit, quis illam adesse inficiari  
ausit: eamq; perniciosissimam,  
quod demonstrant animi de-

fectio vel syncope, assidua vomitio, aut nausea, aut cardiomos, vigiliæ, inquietudo, corporis iactatio, virium omnium, sed præcipuè vitalium prostratio, mors plerumque inopinata, & sine doloris sensu.

Si fortè validior natura diutius obsistit, labes intefim altius promanat in humores, eosque contaminat, quæsi mitior fuerit, febrem infert malignam, ac pestilentem simplicem, sæuior verò carbunculo vel bubone, vel exanthematis stipatam. Quanquam autem sanguis & humores veneno ferè labefactantur, non tamen semper putrescunt: unde sæpe nec turbidæ, nec confusæ spectantur urinæ, sed substantiâ, colore, sedimentoque laudabiles. Hæc pestilentis

febris exquisita est descriptio. Nam si præterea capitis dolor, vel delirium, vel incendium vehemens, vel urinarum magna perturbatio, atque confusio inest: Hæc non ex pestilentialabe, sed ex putrida permissione fiunt, quæ aliàs aliam partem magis laceffens, symptomata varia profert.

*Quæ præcautio singulis necessaria  
ex lib. Palm. de peste cap. 12.*

His cautionibus nisi aëris vitium dissipetur, vnūquémque sibi maturè prospicere, venientemque hostē antequam feriat, aliis machinis profligare conuenit. Omnium securissima atque tutissima præcautio censetur, ipsa fuga, atque loci, aut etiam regionis permutatio. Si quis igitur venientem

pestem fugere potest, néque officiis publicis retinetur, néque rei familiaris angustia impeditur, nihil ei prius faciendum censeo : fugere autem oportet citò, longè & tardè: citò quidem priusquam admisum aëris vitium corporis spiritus, & humores infecerit, cordique se altiùs insinuarit: ex iis enim qui serius locum mutant atque aufugiunt, nō pauci pestis causam intus gestant, quæ vires acquirit cundo, eosque breui in aëre serenissimo atq; saluberrimo loco incautos perimit. Longè verò discedere oportet, extra infectæ pestilentis regionis limites : Nam ad propinquum quo quis se conferat, aëris vitium facilè sequi potest. Præstat autem septentrionem versus fugere; quippe

ab austro ferè omnis pestilentia causa promanat. Diu verò illic immorandum, nec de reddito cogitandum, quandiu vlla mali suspicio suberit. Sed quid suspensionem dico? non prius me iudice redeundum est, quàm aëris prorsus extincta, atque deuicta sit malignitas. Periculosus quippe à salubri loco in grauem & insalubrem transitus, multòque fuisset consultius, aliò non commigrasse, atque publicæ aëris malignitati paulatim affueuisse. Sed nec eà extinctâ satis tutum sit statim redire, quin potius integrum trimestre expectare præstiterit, dum regionis aër pristinam puritatem, atque integritatem receperit.

Si quis optimâ prouisione huiusmodi & præcautione uti



recusarit, siue quòd lucro attentior fuerit, vt de vitâ periclitari, quàm rem minueremalit, siue quòd amicos aut liberos deferere, aut eedes suas aliorum fidei nolit committere, seu quòd munus publicum aut artem ciuibus necessariâ exerceat, hac ratione cõtagionem à se amolietur, & pestis periculum declinabit.

Pestilentiaë causa in aëre residet, qui licet omnibus sit cõmunis, omnes tamèn æquè nō afficit, quòd omnium corpora nō sint huic affectioni opportuna. Certa enim præparatio, & diathesis, quæ eam excipiat necessaria est.

Hæc autem fortè caloris natui, ac vitalis roboris infirmitas, & imbecillitas quædam fuerit, atque excrementorum  
super-

- superuacaneorū collectio ac  
 redundantia. Calor natiuus  
 languidior, vísque cordis in-  
 firmior, pestiferam aëris mali-  
 gnaté dissipare haud potis  
 est, eam verò facile, & nullo  
 impedimento admittit humor  
 noxius in corpore exuperans.  
 Itaque inprimis ei qui in re-  
 gione pestilenti degere vo-  
 let, cura corporis sui habenda  
 est, vt id vaccet excre-  
 mentis, insitúsque calor au-  
 ctior sit, & vitale cordis robur  
 vegetius: nutrum enim per se  
 ac seorsim, corpus à pestis cō-  
 tagione vindicare potest. Nā  
 & venenata pernicies qualescūq;  
 humores attigerit faci-  
 le cōtaminat, nisi robustę natu-  
 ræ viribus illico repulsum, atq;  
 dissipatum venenum euanes-  
 cat: & quamlibet valida vege-

tâque sit corporis facultas, si vitiosis excrementis in putredinem propensis sensim insinuato atque altius impresso. Iam verò corpus ab excrementis excipiendæ pestis idoneis vindicabitur, catharticis non modò ægrotantis naturæ, atq; humorum exuperantiæ, sed etiam grassanti pestilentia reprimendæ accommodatis.

Purgâtibus igitur omnibus cardiaca inserantur, quæ maleficam illorum vim obtundant, vitaléque robur corroborent & augeant. Blanda etiâ sunt cathartica, quæ pestilenti constitutione præscribuntur: Nam effrænata si sint, humoribus violentius exagitatis spiritibúisque vel confusis, vel exhaustis, corpus præparât ad pestem. Omniû pessimum

videtur scammonium; quippe  
venenatâ ac maleficâ labe os  
ventriculi oblædit, & vi effræ-  
natâ vires omnes resoluit, dis-  
sipâtque spiritus. Hoc sequitur  
helleborus, Colocynthis, esu-  
là, lathyris, turpethum, & reli-  
qua huius ordinis, multóque  
magis stibium quauis arte præ-  
paratum. Inter ea quibus vti  
conceditur, primas tenent  
rhabarbarum & aloë: nam nec  
humores nimio perè commo-  
uēt, nec spiritus insigniter dis-  
sipant, nec veneno corpus  
præparant vt superiora, sed  
contrâ immensa amaritudine,  
ac siccitate putridini obfistūt,  
siccântque corpus, quæ dotes  
aduersus pestilentes morbos  
mirificè commendantur. Sen-  
na quia ventriculo aliquâ tum  
grauis, minus est accommo-

da : melancholicis tamen adiectis cardiacis, & feminibus flatus discutientibus præscribenda. Cassia omnium purgantium leuissima ac tenuissima est, sed quæ pestilenti constitutione idcirco reiicitur, quòd vètriculum nimium relaxet atque humectet.

Nihil enim æquè corpus ad pestem præparat, atque nimia partium laxitas, & serosorum excrementorum redūdantia. Iecori tamen concalescenti, maximè si siccum sit corpus, & æstuosum cœlum, adiecto sem. fœniculi momento concedenda. Aloë calida & sicca summè amara saniem biliosam è ventriculo primisque venis, ac visceribus expurgat, vnâq; ventriculum corroborat : ex quâ satis sit hominē eusarcum,

& minimè cacochymum femelin hebdomade, aut quarto quóq; die cōfectatria, quatuorue catapotia ante cibum vorarè, vt humores ab imminenti labe, ac putredine vindicentur. Vidi qui pestilenti cœli statu vnum duntaxat quotidie pastus initio, alios qui duo, diebus alternis deglutirent. Catapotiorum ex aloë quæ in vsu sunt aduersus pestem, alia tuffo adscribantur, alia communia appellantur: hæc autem eximie conferunt, quibus corpus crudis humoribus confectum est, quo quomodo vsurpentur. Etenim præterquam quòd nullâ ventriculi noxâ, nullâque perturbatione, aut molestiâ, ventriculum & primas venas omni sorde expurgant, visceribus etiam robur

## DE FEBRIBVS

addunt, atque humorum putredini, etſi alexiteria quædam habeant, venenatæ peſtis labi ſic aduerſantur, vt quamplurimos, qui ad eam maximè propenſi erant, nullis aliis intro ſumptis alexiteriis, à peſtis contagione præſeruarint: præſtat tamen ea ante cibū quàm à cibo capere. Rhabarbarum pondere dragmæ vnius ante paſtum manditur, aliàs ſolum, aliàs cum viſiſſimis ab acinis mundatis. His conuenit, quibus humidior eſt ventriculus ac iecur infirmius: hoc enim viſcus purgat & corroborat, & ſiccando putredinem arcet. Qui calido & ſicco ſunt corporis habitu, diuturno catapotiorum ex aloë & rhabarbari vſu aliquantum læduntur.

Hic igitur syrupus qui postea describetur erit commodior octauo quóque die, per se, vel ex cocleari ℥β. pondo, vel cum aquâ cardiacâ, aut eius loco syrupus è cichorio qui ℥iiij. rhabarbari habeat pro libris singulis: cui tamé syrupus noster præferendus, qui non solum innoxie purgat, sed etiam pestilétis febris malignitatem cohibet & extinguit. Qui admodum impuro & cacochymo erunt corpore, ante mitiorum catharticum vsum, portione purganti paulò validiore aliquoties repetitâ, quæ in primis erunt sedibus excrementa detrahant.

Reliquum dein præparabitur vel syrupo, vel iulepo, vel apozemate. Denique præparatur humor penitus insertus

L iiij



## DE FEBRIBVS

apozemate cathartico iterato ducetur. Sic purgatâ primâ corporis regione, quam modo dixi præcautionem aggredientur. Néque enim si vel scirrhus in mesenterio, iecore, aut liene, vel veteres obstructions inerunt pestilenti cæli statu, eiusmodi sentina pluribus aut acrioribus catharticis agitari exhaustirique debebit, antequam salubrior aër affulgeat. Hæc definire placuit paulò distinctius, vt iis qui ruri degunt, quiq̃ue exercitato medico destituuntur, facile sit legitimum istorum præsidiorum vsum discernere.

### *Catapotia Communia.*

℞. Aloes opt. ℥ij. myrrh elect. Cinamomi synceri vtriusque ℥j. fiat pulvis qui vino aromatico excipiatur.

*Catapotiana Ruffi.*

℞. Aloes ʒß. ammoniaci electi ʒiiij. myrrhæ ʒiiß. mastich. ʒj. croci gr. vj. concorporentur cum succo mali citrij, aut syrupo de limonibus.

*Catapotia quibus istorum loco felici  
successu hæctenus vsus sum adar-  
cenda pestis contagia.*

℞. Aloes opt. ʒiiß. Rhabarba. elect. myrrhæ vtriúsque ʒß. Croci rad. siccar. gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, helenij, Angelicæ, dictami, agarici albi, ammoniaci, mastich. añ. ʒjß. rasu cornu cerui, margaritarum electarum, terræ sigillatæ, boli armenæ veræ, cinnamomi singul. ʒß. rasuræ cornu vnicornis, ambaris, moschi singul. gr. viij. omnia in tenuissimum puluerem contrita

## DE FEBRIBVS

excipiantur syrupo, qui proximè ponetur, & catapotiorum massa fingatur, adiuciendo Mythridati & theriaces vtriúsque ʒj. vsus tempore ʒij. in catapotia quatuor aptátur, quæ tertio aut quartoquóque die cibo præmittuntur.

℞. succorum depurator. sca-  
bio. bugloss. borag. & oxal.  
succ. citrij singul. ʒij. sacch.  
ʒviij. coquátur in syrupum,  
qui Cinamoni, & sant. citrini  
momento condiaur.

*Syrupus Catharticus ac cardi. siccis  
ac biliosis corporibus adarcendam  
aëris pestilentis contagionē quàm  
catapotia commodior.*

℞. rad. cich. ʒiij. rad. oxa-  
lid. & oxylap. polyp. passul.  
purg. sing. ʒj. rad. torm. dicta-  
mini & elenij singu. ʒß. semi-

nis cardui bened. ℥iiss. calen-  
 du. succis. scabjosæ, meliss. en-  
 diu. scario. borag. bugl. fumi-  
 terræ agrim. capill. vener. be-  
 to. ceterach scolo. verb. ar-  
 tem. plant. sing. m. i. florum  
 cord. beto. corn. genist. ver-  
 bas. sing. p. i. semi. fœnic. ci-  
 tri, oxali. anis. sing. ℥iβ. fol.  
 sennæ munda. ℥iiij coquito ad  
 lib. j. β. adde in fine agar. albi  
 troch. ℥iβ. Cinamo. zedoarię  
 vtriúsque ℥iβ. in 'expressione  
 dissolue saccha. albiss. ℥β. fiat  
 syrupus adde in fine coctionis  
 express. ℥iβ. rhabar. elect. in-  
 fu. in aquâ cardui cū ℥ij. cina-  
 momi, & croci ℥β. capiat ℥iβ.  
 aut ℥ij. pro dosi semel in heb-  
 domade ex cochlea. vel cum  
 aquâ cardiacâ. Hæc quidem  
 cathartica sunt, quibus vicif-  
 sim semel aut bis quâque heb-

# DE FEBRIBVS

domade eum vti velim , qui  
aëris pestilentis incommoda  
propulsare studet. Iam quæ his  
præmittenda sit præparatio  
tradendum.

*Purgatio blanda cacochymo apta  
pestilenti cæli statu , ante descri-  
ptorum cathartorum usum.*

℞. polyp. pass. purg. rad.  
hel. sicc. rad. cich. & oxalid.  
fol. sennæ mund. sing. ʒiij. bug.  
borag. prinpin. scab. succis.  
florum cord. & genist. sing. p.  
i. semi. fœnic. citri acetos. ras-  
cornu cerui sing. ʒß. fiat deco-  
ctio ad dosim. In colaturâ ma-  
cera horis duabus rhabar. ele-  
cti ʒiib. Cinamomi ʒß. in ex-  
press. dissol. syrup. capill. ve-  
ner. ʒj. fiat dosis.

*Præparatio ad maiorem purgatio-  
nem si opus videatur, Esto  
huiusmodi:*

℞. aquarum cardui, morsus,  
scabiosæ bugl. singul. ℥iib. sy-  
rupi de limonibus & capil ve-  
ne. añ. ℥j. fiat Iulep ad duas  
doses ante pastus: vel sic.

℞. rad. hele. sicca, vuarum  
passarum damascenarum, gly-  
cyrr. rad. cich. sing. ℥j. sco-  
bi. cornu cerui, rad. grami. &  
oxylap. sing. ℥ß. coquito ad  
lib. l. adde omnium capill.  
succis. pimpin. borag. oxalid.  
absynthij vulgaris ficci sing. p.  
l. sem. foeni. card. citri & oxal.  
sing. ℥iib. in colaturâ dissol. sy-  
rupi de limonibus ℥iiij. fiat a-  
pozema clarum & conditum  
℥j. Cinamomi.

*Apozema purgatorium quo immi-  
nente peste primæ corporis sedes,  
ipsaque viscera validius  
eluentur.*

℞. polyp. pass. purg. rad.

# DE FEBRIBVS

eicho. cort. rad. capp. & tam.  
sing. ʒß. omnium capill. agri-  
mo. bugl. borag. endiu. scario-  
beto. pimp. succis. sing. m.ß.  
fol. dictami flo. cord. sing. p. r.  
femi. card. citri oxalid. fœni.  
anis. singul. ʒiß. rad. dicta. &  
torm. vtriúsq. ʒj. foliorum  
fennæ mundat. ʒiß. coquito  
inaquâ cardui ad ʒ. x. adde in  
fine agari. albi. ʒß. Cinamo-  
mi, zedoariæ vtriúsq. ʒj. in  
express. diff. syru. de limonib.  
ʒiij. fiat apozema ad tres ma-  
tutinos alternos. His igitur  
corpus ab excrementis ad ex-  
cipiendam pestem ac putredi-  
nem paratis, vindicabitur. Iam  
ad reliqua properemus, quæ  
nullâ manifestâ vacuatione  
pestilentem perniciem arcent,  
cordisque robur tuentur, atq;  
confirmant.

*Descriptiones multorum alexiteriorum, quæ pestis contagia ar-  
cere possunt cap. 13. Electa-  
rum tabellarum forma.*

℞. pul. E. de gemm. & dia-  
marg. frig. vtriúsque ʒij. sco-  
bis cornu cerui, & ebo. Vne-  
donum, trium fant. Corall.  
terr. sigill. boli armeni veræ  
sing. ʒj. rad. dictami, & tor-  
ment. vtriúsq; ʒß. scobis cor-  
nu vnicornis, ambaris vtriúsq;  
gr. xij. moschi gr. iiij. sacchalbi.  
disso. in aquâ theria. quæ po-  
stea describetur ʒiiij. fiat Ele.  
per tabellas pond. ʒiij. cuius  
usus erit ante sing. pastus, præ-  
terquã quo die Catharticum  
aliquod assumptum fuerit.

*Aliud.*

℞. Scobis cornu cerui, &  
ebo. coral. terræ sigill. boli  
arme. sing. ʒj. rad. dictami,



# DE FEBRIBVS

tormentillæ vtriúſque ʒß. rad.  
 Angel. triumſant. pul. Elect.  
 diamarg. frig. ſing. ʒij. ſacch.  
 diſſ. in aquâ car. bene. ʒiiij. fiat  
 Elect. per tabell. pond. ʒiiij. idē  
 præſtat quòd ſuperius, ſed pau-  
 lò imbecillius, eodēmq; mo-  
 do uſurpatur, quia minore cō-  
 ſtat, in re tenui præſcribitur.

## *Puluis.*

℞. ſcob. ebo. & cornu cerui  
 vtriúſq; ʒij. marg. ele. pul. roſ.  
 rubra. vtriúſque ʒj. terræ ſigill.  
 boli armenæ vtriúſq; ʒij. rad.  
 dict. & torment. fol. dictami  
 veri ſing. ʒß. ſemi. fœni. co-  
 rian. præparati vtriúſque ʒiiij.  
 folio. polyp. menthæ. meliſſ.  
 ſal. min. verb. plant. ruthæ,  
 puleg. rega. ſing. ʒj. rad. ang.  
 lign. aloes, ſant. cit. zedo. ſing.  
 ʒß. folia auri 40. fiat omnium  
 Puluis tenuiſſ. Cui adde ſacch.

ros. octuplum, moschi, ambarris vtriúsque gra. viij. Cuius vsus erit ante singulos pastus, atque interdum in fine.

*Alius suauior puluis minoris constans, sed non adeò efficax.*

℞. Cornu ceruini ʒiʒ marg. corall. terr. figill. boli armenæ veræ sing. ʒʒ. sem. fceni. coriã præpa. vtriúsque ʒj. fiat puluis, cui adde sacch. ros. octuplum; Vel sic suauissimus, ac efficacissimus, sed rarissimus.

*Puluis.*

℞. marg. elect. scobis cornu ceruini, ossis de corde cerui singul. ʒʒ. scobis monocerotis, ambaris, lig. aloes, terræ figill. zedo. sant. citri. sing. ʒj. moschi gr. iiij. fiat puluis, cui adde sacch. ros. sextuplum.

Opiata præstâtissima hora sôni

DE FEBRIBVS  
vsurpanda, & mane ante cu-  
biculi egressum.

*Opiata cardiaca calidis naturis  
commoda.*

℞. flo. bugl. bor. cariophyl.  
nostra. ros. rubr. separatim cō-  
ditorum sing. ℥j. terræ lem-  
niæ, boli armenæ, scobis cor-  
nu ceruinj sing. ʒij. marg. ʒj.  
Ambaris ʒß. syrup. de succo  
bugl. quant. suff. fingito opia-  
tam vel sic in frigidioribus na-  
turis.

*Opiata alia frigidioribus  
commodior.*

℞. Conser. ros. rubr. florum  
bugl. bor. & beton. coro. seu  
cariophyl. nostrat. sing. ℥j. mi-  
thrid. ʒß. theriaces venetæ ʒij.  
pulu. cornu cerui ʒj. marg.  
elect. scobis cornu vnicor-  
nis, vtriúsque ʒj. terræ lem-  
niæ, boli armenæ, vtriúsque

3iij. mosch. gr. vj. auri folia 20.  
 fiat opiata cum siru. conserua-  
 tionis cort. citri conditi, aut  
 nucis moschatae conditae ca-  
 piat 3j. aut 3iβ. pro dosi horā  
 somni, vel manē antequam re-  
 feratur cubiculum, & superbi-  
 bat 3ij. aquae scabiosae, idque  
 bis terue in hebdomade.

*Vinum inulatum amarum quidem  
 & ingrātū, sed ad arcenda pestis  
 incommoda mirē efficax, si ma-  
 nē hauriatur. ante ientaculum,  
 frigidis praesertim & humidis  
 naturis.*

℞. Rad. hel. sic. 3iβ. rad.  
 angel. dictami. torm. & genti.  
 sing. 3ij. fol. sicco. menthae ab-  
 synth. vulg. ruthae sing. p.i. vi-  
 ni albi optimi lib. vj. ponan-  
 tur omnia in phialā, quae soli  
 exponatur, aut loco calido

DE FEBRIBVS

afferuetur dies vj. ante vsum  
dosis ℥i℥. aut ℥ij. mane per se,  
vel cum pari portione aquæ  
cardui bened.

*Noduli sæpe olfaciendi consti-  
tutione pestilenti*

℞. folio. ment. melissophy.  
orig. pul. maio. thymi, ros. ru-  
br. lauād. sing. p. i. nucis mos-  
cha. Cariophyll. rad. Angel.  
cinamo. sing. 3j. Croci ℥ij.  
fiāt noduli qui noctu vino ma-  
cerētur aromatico, vel aceto,  
vel aq. ros. spongia in liquore  
macerata pro nodulo esse po-  
test.

*Pomum.*

℞. Ladani ℥i℥. benio. styrac-  
calam. vtriúsq. ℥℥. rad. Ireos  
flor. sant. citri. macis, corticis  
citrij sicci, ros. cario. calam. a-  
ro. rad. ang. sin. 3℥. cinam. ℥ij.  
ambrae moschi, zibeti sing. ℥℥.

fiat pomum cum mucagine  
gummi tragacanthæ, extracta,  
in aq. ros. multò plus moschi  
& ambaris adiici potest, sed in  
calidis naturis, & æstate, caput  
nimium ferit ac vellicat.

*Aliud pomum suaueolentius.*

℞. Ladani ℥ii. benio. styra.  
calami. vtriúsque ℥ß. subigan-  
tur diu aquâ damascenâ, opti-  
mâ, dein adde pul. tenuiss. rad.  
Ireos flor. 3iß. malexentur si-  
mul cum oleo amyg. dulcium  
loto in aquâ damascenâ ad-  
dendo sub finem moschi, am-  
baris vtriúsque ʒj. zibethi ʒij.  
fiat pomum iustæ consisten-  
tiæ.

*Aliud omnium suauissimum.*

℞ Benionij, styra. calam.  
sing. 3ij. Ladani ℥ß. rad. Ireos  
flor. pul. ros. sant. citr. sing. 3j.  
cariophyll. Cyperi, calam.

DE FEBRIBVS

arom. cort cit. sing. gr. vj. mos-  
chi gr. viij ambaris, zibeti, v-  
triúsq; gra. vj. subigantur cum  
mucagine gummi tragacanth.  
Elicita in aquâ ros. fiat pomũ.

*Sal vsurpandus pestilenti  
coeli statu.*

℞. Aquæ Theriacal. ℥vj. a-  
quæ ros. ℥ij. salis marini opti-  
mi ℥iiij. olla noua plumbo in-  
tus illita feruefiat dum aqua  
absumpta sit. Sal adseruetur  
ad vsum, cui vsus tempore du-  
plum pulueris rasuræ cornu  
cerui inferetur, & 3j. salis ru-  
thacei.

*Puluis farinae qua panis con-  
ficietur permiscendus.*

℞. semi. fceni. dulc. ℥j. semi.  
anisi ℥ß. scobis cornu ceruini  
℥iß. scobis eboris 3ij. rad. di-  
cta. & torment. vtriúsque 3i.  
fiat puluis tenuissi. qui cum li-

bris duodecim, fermentatæ massæ è qua panis conficietur, miscbitur, fiétque panis bis coctus. Si suauior desideratur sacchari libra adiicienda est. Multorum simplicium medicamentorum vis vsûque postea tradetur, in curatione pestilentis febris, quorum tamen vis præcipua est, ad eius præcautionem.

Descripta præsidia omnibus communia sunt ad arcêda pestis cõtagia, quæ prudēs, exercitatusque medicus singulorũ aptabit naturis, vtendiq; modum præfiniet. Solæ prægnantes supersunt, quæ horũ usu oblædi possint. His enim nulla purgatio tuta, nisi quæ per cassiam, & per rhabarbarum adhibetur, nec alexiteria salutaria, quæ vehementer ape-



riunt, & excalfaciunt ne fœtum excutiant. Ex iis igitur quæ descripta sunt, ea seligantur, quæ citra insignem calorem, aut aperiendi, atque incendi facultatem putredini & pestilenti constitutioni contraria sunt. Cuiusmodi habentur terra lemnia, bolus armena, cornu ceruinū, & monocerotis, aquæ cardiacæ bugl. borag fucis. attractil. conseruæ ros. bugl. viol. beton. aut solæ, aut cū mithrid. momento. E diamarg. frigidi de gemmis & similia.

*Curatio iam correptorum ex  
Holl. libello de peste.*

Videndum imprimis an venenū cor appetat: celer enim morbus est, & qui naturam inopinatò obsessam perimit derepente.

Viden-

Videndum etiam anne vitalis facultas deficiat, initio ergo vtrumq; præstandum est, tum iis quæ antidota sunt, tum motu, frictione, & similibus, quæ foras euocant. Sed quia aliquantum vigiliâ, motu, & frictione, spirituum inanitio fit, habenda perpetuò vitæ ratio; Nam vt naturalis & animalis facultas integræ sunt, vitalis concidit. Initio igitur detur aliquod supradictorum antidotorum. Vel:

℞. Rad. tormen. beto. dicta. gent. morsus diab. cum radice & herba croci añ. 3j. fiat puluis. Dosis 3ij. cum vino aquâ rosarum lymphato. Et vt sunt vires, destillatum cum vino granatorum, berberorū, aqua tormentillæ; & expressiones, colatitia alterata, vt di-

M

dictum est. Tum de vacuatione cogitandum.

Phlebotomia, si omnia permittunt. Alioqui purgatio, vt in humoribus.

Hellebori 3j. pomo concluditur. Pomum cōuoluitur stuppâ, aquâ rosarum prius madefactâ, & expressa, & ita in cineribus coquitur. Abijcitur helleborus. Pomum conspersum puluere aliquo salutari, datur fortioribus quidem: nam debilioribus secundo pomo iterum coquitur. Secundum pomum datur. Iulep è vino granatorum, berberorum, aqua hordei cum saccharo, ex aquis intybi. Aqua saccharata cum Iulepo violato aromatizato pul. supradictis.

Cibus è mediâ materia, qui facilè coquatur.

Aër obiectus aut salutaris. sepe cōmutatus, vt cubile molle &c. Somno abstineat, nisi vires dissolutæ videantur.

*Auicennæ familiare hoc erat ad pestem alexiterium.*

℞. Aquæ ros. ℥ij. vini albi, aut clari, tenuis, odoriferi ℥j. boli armenæ tritæ subtilissimè 3j. Si euomat, malum est: sed abluatur os vino. Deinde repetatur antidotus: debet enim, vt etiam non reuomat, sæpius iterari. Quanquam qui retinent, ferè euadunt.

Clysteribus, balanis lenibus, Catharticis quotidie alius lenienda.

Epithemata cordi ex aquâ rosarum viol. bugloss. & cum aceto, vino granatorum, ca-

• M ij

# DE FEBRIBVS

eicho. cort. rad. capp. & tam.  
sing. ʒß. omnium capill. agri-  
mo. bugl. borag. endiu. scario-  
beto. pimp. succis. sing. m.ß.  
fol. dictami flo. cord. sing. p. i.  
femi. card. citri oxalid. fœni.  
anif. singul. ʒiß. rad. dicta. &  
torm. vtriúſque ʒj. foliorum  
fennæ mundat. ʒiß. coquito  
inaquâ cardui ad ʒ. x. adde in  
fine agari. albi. ʒß. Cinamo-  
mi, zedoariæ vtriúſque ʒj. in  
express. diff. syru. de limonib.  
ʒiij. fiat apozema ad tres ma-  
tutinos alternos. His igitur  
corpus ab excrementis ad ex-  
cipiendam pestem ac putredi-  
nem paratis, vindicabitur. Iam  
ad reliqua properemus, quæ  
nullâ manifestâ vacuatione  
pestilentem perniciem arcent,  
cordisq; robur tuentur, atq;  
confirmant.

*Descriptiones multorum alexiteriorum, quæ pestis contagia ar-  
cere possunt cap. 13. Electa-  
rum tabellarum forma.*

℞. pul. E. de gemm. & dia-  
marg. frig. vtriúsque ʒij. sco-  
bis cornu cerui, & ebo. Vne-  
donum, trium fant. Corall.  
terr. sigill. boli armeni veræ  
sing. ʒj. rad. dictami, & tor-  
ment. vtriúsq; ʒß. scobis cor-  
nu vnicornis, ambaris vtriúsq;  
gr. xij. moschi gr. iij. sacchalbi.  
disso. in aquâ theria. quæ po-  
stea desoribetur ʒiiij. fiat Ele.  
per tabellas pond. ʒiiij. cuius  
vsus erit ante sing. pastus, præ-  
terquã quo die Catharticum  
aliquod assumptum fuerit.

*Aliud.*

℞. Scobis cornu cerui, &  
ebo. coral. terræ sigill. boli  
arme. sing. ʒj. rad. dictami,

# DE FEBRIBVS

tormentillæ vtriúſque ʒß. rad.  
 Angel. triumfant. pul. Elect.  
 diamarg. frig. ſing. ʒij. ſacch.  
 diſſ. in aquâ car. bene. ʒiiij. fiat  
 Elect. per tabell. pond. ʒiij. idē  
 præſtat quòd ſuperius, ſed pau-  
 lò imbecillius, eodēmq; mo-  
 do uſurpatur, quia minore cō-  
 ſtat, in re tenui præſcribitur.

## Puluis.

℞. ſcob. ebo. & cornu cerui  
 vtriúſq; ʒij. marg. ele. pul. roſ.  
 rubra. vtriúſque ʒj. terræ ſigill.  
 boli armenæ vtriúſq; ʒij. rad.  
 dict. & torment. fol. dictami  
 veri ſing. ʒß. ſemi. fœni. co-  
 rian. præparati vtriúſque ʒiiij.  
 folio. polyp. menthæ. meliſſ.  
 ſal. min. verb. plant. ruthæ,  
 puleg. rega. ſing. ʒj. rad. ang.  
 ſign. aloes, ſant. cit. zedo. ſing.  
 ʒß. folia auri 40. fiat omnium  
 Puluis tenuiſſ. Cui adde ſacch.

ros. octuplum, moschi, ambarris vtriúsque gra. viij. Cuius vsus erit ante singulos pastus, atque interdum in fine.

*Alius suauior puluis minoris constans, sed non adeò efficax.*

℞. Cornu ceruini ʒiʒ marg. corall. terr. figill. boli armenæ veræ sing. ʒʒ. sem. fceni. coriã præpa. vtriúsque ʒj. fiat puluis, cui adde sacch. ros. octuplum; Vel sic suauissimus, ac efficacissimus, sed rarissimus.

*Puluis.*

℞. marg. elect. scobis cornu ceruini, ossis de corde cerui singul. ʒʒ. scobis monocerotis, ambaris, lig. aloes, terræ figill. zedo. sant. citri. sing. ʒj. moschi gr. iiij. fiat puluis, cui adde sacch. ros. sextuplum. Opiata præstâtissima hora sôni



vsurpanda, & mane ante cubi-  
culi egressum.

*Opiata cardiaca calidis naturis  
commoda.*

℞. flo. bugl. bor. cariophyl.  
nostra. ros. rubr. separatim cō-  
ditorum sing. ℥j. terræ lem-  
niæ, boli armenæ, scobis cor-  
nu ceruinj sing. ʒij. marg. ʒj.  
Ambaris ʒß. syrup. de succo  
bugl. quant. suff. fingito opia-  
tam vel sic in frigidioribus na-  
turis.

*Opiata alia frigidioribus  
commodior.*

℞. Conser. ros. rubr. florum  
bugl. bor. & beton. coro. seu  
cariophyl. nostrat. sing. ℥j. mi-  
thrid. ʒß. theriaces venetæ ʒij.  
pulu. cornu cerui ʒj. marg.  
elect. scobis cornu vnicor-  
nis, vtriúsque ʒj. terræ lem-  
niæ, boli armenæ, vtriúsque

3iij. mosch. gr. vj. auri folia 20.  
 fiat opiata cum siru. conserua-  
 tionis cort. citri conditi, aut  
 nucis moschatae conditae ca-  
 piat 3j. aut 3iβ. pro dosi hora  
 somni, vel mane antequam re-  
 feratur cubiculum, & superbi-  
 bat 3ij. aquae scabiosae, idque  
 bis terue in hebdomade.

*Vinum inulatum amarum quidem  
 & ingratiū, sed ad arcenda pestis  
 incommoda mirè efficax, si ma-  
 nè hauriatur. ante ientaculum,  
 frigidis praesertim & humidis  
 naturis.*

℞. Rad. hel. sic. 3iβ. rad.  
 angel. dictami. torm. & genti.  
 sing. 3ij. fol. sicco. menthae ab-  
 synth. vulg. ruthae sing. p.i. vi-  
 ni albi optimi lib. vj. ponan-  
 tur omnia in phialâ, quae soli  
 exponatur, aut loco calido

DE FEBRIBVS

asseruetur dies vj. ante vsura  
dosis ℥i℥. aut ℥ij. mane perse,  
vel cum pari portione aquæ  
cardui bened.

*Noduli saepe olfaciendi consti-  
tutione pestilenti*

℞. folio. ment. melissophy.  
orig. pul. maio. thymi, ros. ru-  
br. lauād. sing. p. i. nucis mos-  
cha. Cariophyll. rad. Angel.  
cinamo. sing. 3j. Croci ℥ij.  
fiāt noduli qui noctu vino ma-  
cerētur aromatico, vel aceto,  
vel aq. ros. spongia in liquore  
macerata pro nodulo esse po-  
test.

*Pomum.*

℞. Ladani ℥i℥. benio. styra:  
calam. vtriúque ℥℥. rad. Ireos  
flor. sant. citri. macis, corticis  
citrij sicci, ros. cario. calam. a-  
ro. rad. ang. sin. 3℥. cinam. ℥ij.  
ambrae moschi, zibeti sing. 3℥.

fiat pomum cum mucagine gummi tragacanthæ, extracta, in aq. ros. multò plus moschi & ambaris adiici potest, sed in calidis naturis, & æstate, caput nimium ferit ac vellicat.

*Aliud pomum suaueolentius.*

℞. Ladani ℥ii. benio. styra. calami. vtriúsque ℥ß. subigan-  
tur diu aquâ damascenâ, opti-  
mâ, dein adde pul. tenuiss. rad.  
Ireos flor. 3iß. malexentur si-  
mul cum oleo amyg. dulcium  
loto in aquâ damascenâ ad-  
dendo sub finem moschi, am-  
baris vtriúsque ʒj. zibethi ʒij.  
fiat pomum iustæ consisten-  
tiæ.

*Aliud omnium suauissimum.*

℞ Benionij, styra. calam.  
sing. 3ij. Ladani ℥ß. rad. Ireos  
flor. pul. ros. sant. citr. sing. 3j.  
cariophyll. Cyperi, calam.

# DE FEBRIBVS

arom. cort cit. fing. gr. vj. mos-  
chi gr. viij ambaris , zibeti, v-  
triúsq; gra. vj. subigantur cum  
mucagine gummi tragacanth.  
Elicita in aquâ ros. fiat pomû.

*Sal vsurpandus pestilenti  
cœli statu.*

℞. Aquæ Theriacal. ℥vj. a-  
quæ ros. ℥ij. salis marini opti-  
mi ℥iiij. olla noua plumbo in-  
tus illita feruefiat dum aqua  
absumpta sit. Sal adseruetur  
ad vsum, cui vsus tempore du-  
plum pulueris rasuræ cornu  
cerui inseretur, & 3j. salis ru-  
thacei.

*Puluis farinae qua panis con-  
ficietur permiscendus.*

℞. semi. scœni. dulc. ℥j. semi.  
anisi ℥ß. scobis cornu ceruini  
℥iß. scobis eboris 3ij. rad. di-  
cta. & torment. vtriúsq; 3i.  
fiat puluis tenuissi. qui cum li-

bris duodecim, fermentatæ massæ è qua panis conficietur, miscebitur, fiétque panis bis coctus. Si suauior desideratur sacchari libra adiicienda est. Multorum simplicium medicamentorum vis vsûque postea tradetur, in curatione pestilentis febris, quorum tamen vis præcipua est, ad eius præcautionem.

Descripta præsidia omnibus communia sunt ad arcēda pestis cōtagia, quæ prudēs, exercitatûsque medicus singulorū aptabit naturis, vtendiq; modum præfiniet. Solæ prægnantes supersunt, quæ horū vsu oblædi possint. His enim nulla purgatio tuta, nisi quæ per cassiam, & per rhubarbarum adhibetur, nec alexiteria salutaria, quæ vehementer ape-

# DE FEBRIBVS

riunt, & excalfaciunt ne fœtum excutiant. Ex iis igitur quæ descripta sunt, ea seligantur, quæ citra insignem calorem, aut aperiendi, atque incendi facultatem putredini & pestilenti constitutioni contraria sunt. Cuiusmodi habentur terra lemnia, bolus armena, cornu ceruinũ, & monocerotis, aquæ cardiacæ bugl. borag fucis. attractil. conseruæ ros. bugl. viol. beton. aut solæ, aut cū mithrid. momento. E diamarg. frigidi de gemmis & similia.

*Curatio iam correptorum ex  
Holl. libello de peste.*

Videndum imprimis an venenũ cor appetat: celer enim morbus est, & qui naturam inopinatò obsessam perimit derepente.

Viden-

Videndum etiam anne vitalis facultas deficiat, initiò ergo vtrúmque præstandum est, tum iis quæ antidota sunt, tum motu, frictione, & similibus, quæ foras euocant. Sed quia aliquantùm vigiliâ, motu, & frictione, spirituum inanitio fit, habenda perpetuò vitæ ratio; Nam vt naturalis & animalis facultas integræ sunt, vitalis concidit. Initiò igitur detur aliquod supradictorum antidotorum. Vel:

℞. Rad. tormen. beto. dicta. gent. morsus diab. cum radice & herba croci añ. 3j. fiat puluis. Dosis 3ij. cum vino aquâ rosarum lymphato. Et vt sunt vires, destillatum cum vino granatorum, berberorū, aqua tormentillæ; & expressiones, colatitia alterata, vt di-

M



dictum est. Tum de vacuatione cogitandum.

Phlebotomia, si omnia permittunt. Alioqui purgatio, vt in humoribus.

Hellebori 3j. pomo concluditur. Pomum cōuoluitur stuppâ, aquâ rosarum prius madefactâ, & expressa, & ita in cineribus coquitur. Abiicitur helleborus. Pomum conspersum puluere aliquo salutari, datur fortioribus quidem: nam debilioribus secundo pomo iterum coquitur. Secundum pomum datur. Iulep è vino granatorum, berberorum, aqua hordei cum saccharo, ex aquis intybi. Aqua saccharata cum Iulepo violato aromatizato pul. supradictis.

Cibus è mediâ materia, qui facîle coquatur.

Aër obiectus aut salutaris. sepe cōmutatus, vt cubile molle &c. Somno abstineat, nisi vires dissolutæ videantur.

*Avicennæ familiare hoc erat ad pestem alexiterium.*

℞. Aquæ ros. ℥ij. vini albi, aut clari, tenuis, odoriferi ℥j. boli armenæ tritæ subtilissimè ʒj. Si euomat, malum est: sed abluatur os vino. Deinde repetatur antidotus: debet enim, vt etiam non reuomat, sæpius iterari. Quanquam qui retinent, ferè euadunt.

Clysteribus, balanis lenibus, Catharticis quotidie aluus lenienda.

Epithemata cordi ex aquâ rosarum viol. bugloss. & cum aceto, vino granatorum, ca-

• M ij

phurâ, fantalis &c. & modico  
vini.

*Pestis symptomata ex cap. 24. lib.*

*Iul. Palm. de febre pestilenti.*

Febris pestilens interdum  
mittis ferèque horrendis sym-  
ptomatis stipata est, quorum  
non aliud dolore capitis vr-  
get frequentius, præsertim in  
febris pestilentibus nothis  
putridæ constitutioni implici-  
tis, & in naturis, quibus caput  
frigidum & humidum, ac sero  
perfusum est. Hic minimè sem-  
per est huiusmodi, sed pro di-  
uersa veneni populariter graf-  
santis affectione, & corporum  
naturâ variat. Pestilentes fe-  
bres putridæ constitutioni im-  
plexæ, quæ Lutetiæ sæuebant  
anno: 1568. ab atrocissimo fe-  
rè capitis dolore initium ca-

piebant, qui nullis remediis leuatus, quarto aut septimo die sponte conquiescebat, interdum nullâ, interdum manifestâ vacuatione. Causa igitur censi debet non cerebri, aut membranarum ipsius inflammatio, sed maligna pestilentis veneni pernicies, quæ è venis & arteriis vnâ cum tetrâ vaporibus cò sublata, serosos humores in capite cumulos inficit, tûmque sopor adest & veternus, qui tum nullus apprehenditur, quum capite excrementis vacuo, sentientes membranas pungit, ac velliat.

*Curatio.*

Si nec somnum intercipit, nec crudelius angit capitis dolor, propriâ curatione nihil o-

pus est. Sublato enim morbo symptoma protin<sup>9</sup> euanesct. At si tam immaniter discruciat, vt somnum inire non patiat, sed præ vigiliis, & corporis iactatione, spiritus & vires labefactet, phrenitim eò tractis biliosis humoribus portendit, & curatione indiget. Leniētibus igitur topicis, quę pestis curationi non obsint, is est demulcendus.

Clysteres itaq; alternis diebus iniiciuntur, qui sensim deorsum reuellant quę in caput ferantur. Raso capillo manē & vesperi, embroche capiti adhibebitur, ex oleis nymphę, rosarum, violarum, chamæmeli, & liliorum lotis in aceto superposito lanę succidæ cucullo, aut si calor vrgebit, lin-teolo oxyrhodino imbuto, &

leuiter expreffo. His enim qui  
iani capiti impactus humor e-  
rit, digeretur: qui verò adhuc  
influet, repelletur. Si ne his  
quidem fedabitur, benefaciet  
cataplasma; è candidi panis  
minuta, croco, puluere betoni-  
cæ, oleo ros. & lacte caprino,  
aut vaccino.

Gallus gallinaceus dissectus,  
& exenteratus capiti quàm  
maximè calens adhibitus, non  
rarò crudeles dolores lenire  
visus est, & febrim deliria cō-  
proscere. Quocirca hoc etiam  
præsidium vsurpandum. Plu-  
res autem Galli subinde impo-  
nantur, parti quæ insideant,  
singuli horis tribus, aut qua-  
tuor ad summū. Si enim diu-  
tius remaneant, foetorem edūt,  
cordi ac visceribus infensum.  
Vicem galli supplere possunt

## DE FEBRIBVS

vituli, aut veruecis pulmones adhuc calentes. Nullâ quidem hæc occultâ proprietate pol-  
lent aduersus capitis dolores,  
aut phrenitidas, sed quia calo-  
rem obtinent insito nobis ca-  
lori finitimum & amicissimum;  
eius auxilio cerebrum corro-  
borant, ac talium symptoma-  
tum causam digerunt.

Opem ferunt & anodina re-  
percutienti materiæ mista, si  
fronti aut temporibus adhi-  
beantur, abstinendo tamen à  
narcoticis & stupefacientibus  
omnibus. Hæc si non statim  
liberant, continuanda tamen  
sunt, quoniam si dolorem non  
tollūt, certè imminuūt, ægro-  
tūmque recreant tantisper  
dum in morbi curationem in-  
cumbetur. Magno in errore  
versantur, qui neglecto occulto

morbo, profligandis manifestis symptomatis se totos addicunt. Quorsum enim attinet, ad dolorem capitis, qui aliquādo in peste exercet, venam resignare, primū quidē humerariam externam, deinde arterias temporum, postremo hæmorrhagiam è naribus cingere? An non naturæ in profligādo morbo occupatæ motus conatúsque peruertitur, dum quod vi expultrice in extimas partes, easque inferiores tempestiuè propulerat, misso sanguine sursum reuellitur, eiusque robur dissoluitur. Sed de his alibi plura. Narcotica, & soporifera omnia medicamentā naturæ vires stupefaciunt, debilitant, & à morbi concoctione auocant, habentque qualitates alexiteriis planè cō-



## DE FEBRIBVS

traria: quo fit, vt tanquam ip-  
famet pestis fugienda sint om-  
nia.

### *De vomitione.*

Quum vomitio peste cor-  
reptos acerbiùs infestat, sunt  
qui existimēt naturam expul-  
trice vètriculi facultate, quod  
molestum est, ipsam scilicet,  
febris causam, à se amoliri, ac  
foras propellere, velintq; eius  
conatum vomito exhibito  
medicamēto promouere. Sed  
ij longè falluntur. Nam quò  
magis vrget vomitio, hoc pe-  
riculosior febris pestilens esse  
solet, vt etiā plures vomē-  
di finem non fecerint, donec  
animam vomendo profude-  
rint. Tenuis adeò essentia est  
venenum pestiferum vt om-  
nem arte factam vacuationem  
eludat, si sudorum profusio-

nem excipias, ideoque ad cu-  
 rationem vel intus propriis an-  
 tidotis extinguendum est, vel  
 in sudores digerendum negle-  
 cto: symptomatico vomitu:  
 Non enim naturæ victricis ro-  
 bore, quæ illuc se exonerare  
 contendat (quum neque cō-  
 ueniens, neque ad excluden-  
 dum venenum satis idonea vi-  
 sa sit,) sed venenatâ pernicie,  
 quæ illius robur prostermit &  
 dissoluit, vomitus in peste ex-  
 citatur, vitiosa quidem excre-  
 menta aliàs pituitosa, aliàs bi-  
 liosa, interdum etiam nigra,  
 vomentes reiciunt, præfer-  
 tim verò caco chymi & cache-  
 ctici, sed citra vllam alleuatio-  
 nem morbi: manet enim va-  
 cuatis etiam excrementis, pe-  
 stifera cordi & ori ventriculi  
 impressa qualitas totius mali.

## DE FEBRIBVS

author, quæ os ventriculi nervosum & acutissimo sensu præditum acriter feriens, ventriculum, ad id quod negotium facescit excludendum, incitat. Quòd igitur ad auxilia attinet, alexipharmaca propria sunt huius symptomatis remedia. Eius enim vim atque impetum intrò sumpta, vel prorsus cohibent, vel infrænant, nec aliis ad curationem symptomatici vomitus opus est. Si fortè tamen ventriculus, nimis effrænata vacuatione laceratur, ac dissolvitur, extrinsecus etiam adhibitis præfidiis iuvandus.

Commodus & opportunus fons, eius calorem suscitare potest, flatus discutere, malignam veneni perniciem ori ipsius impressam obtundere,

vomitionem denique cohibere, si in hunc modum comparetur.

℞. folio sicco. mentæ, sam-  
 pfuschi, absynt. vulg. orig. ca-  
 lam. thymi, puleg. meliss. ar-  
 temisiæ summit. anethi sing.  
 p. i. sem. anisi, fœnic. cardui  
 rad. cyp. calami aromat. cu-  
 iusque ʒß. nucis moscha. Ca-  
 riophyll. macis sing. ʒß. confi-  
 cito sacculos qui ferueant ali-  
 quantisper in aquâ; dein adde  
 vini odoriferi tertiam partem,  
 mithridat. ʒiß. aceti, aquæ ros.  
 vtriusque ʒiijß. Adhibeatur fo-  
 tus ventriculo ex spongiâ, vel  
 ipsimet sacculi vicissim appli-  
 centur. Item ex oleo saluiæ &  
 rorismarini arte chymica ex-  
 tracto, cui aceti & mithrida-  
 tij añ. ʒj. accesserit, mox à fo-  
 tu resiccatus locus illinendus.

Sialuus adstrictior fuerit, cly-  
stere potius quàm cathartico  
ducenda, in quo vt etiam ad-  
uersus pestilentem perniciem  
vires habeat, mithrid. zij. dis-  
soluentur. *goliq. in ylt. mal.*  
*De singulis.*

Frequens præterea esse so-  
let in febre pestilenti singultus.

Hunc autem aër veneni per-  
nicies, quæ altius ventriculi tu-  
nicis impacta, vinleius expul-  
tricè stimulat ad id quod one-  
rosus est, aut vellicat, exclu-  
dendum. Hæc igitur eius mo-  
di motu quod molestum est  
expellere, sed frustra adnritur:  
quod tenuis ea qualitas parti-  
bus tenaciùs impressa, eius  
motum omnem, acque cona-  
tum facillè eludat ac superet.  
Perniciosum sanè symptoma  
in omni malignâ febre, sed

magis si arte factam vacuationem sequitur. Néque tamen aliis remediis opus fuerit, quã descriptis alexipharmacis, & fotumodo proposito. Si fortè excrementorum in ventriculo collectorum copia singultū inferre videbitur, remedia sunt, clyster, bládum catharticum alexiterio temperatum, & fots. Sed hæc causa rarò locum habet in hoc affectu, ~~ut~~que vnquam tutò datur catharticum ante morbi declinationem, in legitimâ peste.

*De vacuationibus spontaneis quæ in hoc morbo contingunt.*

Si qua fortè naturalis vacuatio diu præter naturam suppressa, sub hoc morbo, siue è naribus, siue ex hemorrhoidibus, siue in mulieribus ex utero

erumpat , per initia minimè  
 cohibenda, aut præpedienda,  
 sed si minor aut pigrior videa-  
 tur, promouenda potius , atq;  
 acceleranda, quemadmodum  
 & hæmorrhagia omnis, quam  
 natura die critico molietur. At  
 si immodica vires ita proster-  
 nit, vt syncopas accersat, tum  
 difficilis est iudicij ; nam siue  
 finitur, siue cohibetur, æger in  
 vitæ discrimine versatur.

Si finitur quidẽ, quòd erum-  
 pens sanguis secum calorem,  
 spiritus, & animam eripiat: sin  
 occurritur, quòd venenata la-  
 bes quam natura cum sangui-  
 ne, licet fortè purissimo pro-  
 fundebat, procúlque à corde  
 vitæ principio amandabat, in-  
 trorsum ad viscera remeans,  
 necis consecutionem afferat,  
 sed maximè quùm sectâ venâ

sistitur. Anno 1568, febres pestilentes fluente è naribus sanguine copiosissimo, eoque ferè florido, magnâ, ex parte iudicatę sunt. Ex iis qui ad lypothymiam vsque sanguinẽ profundebant, pauci euaserunt, quibus vena in brachio fita, ad reuulsionem secta fit.

Qui verò totum naturę negotium committētes, alimentis ac medicamentis cardiacis prostratas vires resarciebant, omnes ferè percurabant, quãlibet frequentes ac graues viderentur animi defectiones: multis auxilio fuere epithemata, cardiaca & refrigerantia iecori & cordi, adstringentia verò fronti & naribus, vnde sanguis emanabat adhibita: sed illa quãmlibet citò citra periculum cordi & iecori ad-



mouentur, hæc verò non nisi quum sanguinis quantum satis est defluerit, fronti, temporibus, & naribus applicari debent.

*De sanguinis reiectione, atque exsecratu.*

Est & aliud pestilentis morbi pessimum symptoma, sanguinis screatus; atque reiectionis. Hæc autem fit, venâ, aut arteriâ, in pectore apertâ, ruptâ, exesa, vel dehiscente.

Quum enim carbunculi, vel alia tubercula illic intus protuberant, nisi dehiscant breui occidunt. Si verò aperiantur, ac findantur, prorumpente sanguine vita eripitur: magnæ igitur hic vndique premunt angustiae. Expuitur interdum & per pleuritidas, quæ cum pestilenti febre aliquâdo con-

currunt, sed minore periculo, si modo opportunè imperatur venæ sectio, semel bis, ter quaterue: si difficultas spirandi cum lateris dolore, & cruento sputo conjuncta id expostulare videatur. Omnia huius symptomatis, à quacúmque causa prodeat, remedia medicis notissima, verùm ne sanguis prorumpat, ac expuatur, si pestilens febris inest, auxiliis quæ valenter adstringant minimè impediendum, quin potius cum venenatus sit, vt effluat curandum: & pro adstringentibus, danda quæ leuiter detergeant, ardoremque temperent, velut hordei decoctum cum saccharo ros. syrupus violaceus, & reliqua eius generis.

## DE FEBRIBVS

### *De alui profluvio.*

Alui profluvium in omni febre pestilenti suspectum est, & periculosum, si bubonis & carbunculi suppurationē, & vrinarum concoctionem, aliorum symptomatum remissionem anteuertat. Nam præterquam quòd spiritus dissipat, atteritque vires, venenatam etiam morbi perniciem, quam prouida natura in extimas corporis partes longissimè à corde diffitas, & ignobiles deponere conabatur, in præcordia reuocans, exitium adfert. Eius causa censerì debet, non naturæ robur, visque expultrix vegetior, sed venenata ac pestilens morbi labes omnium partium; sed maximè ventriculi, vim retentricem sic dissoluēs, ut minimè cibum vel ample-

atur vel concoquat. Symptomaticum igitur quum sit, tantum abest vt proſit, vt inſitum calorem ac ſpiritus breui labefactet, naturæque robur infringat & opprimat. Secus planè iudicandum, quum decretorio die accedit, coctionis ſignis iam conſpicuis, repurgato bubone, recreatâq; quodammodo naturâ.

In malignis tamen & peſtilentibus febribus, in quibus nec bubones, nec carbunculi protuberât, nec ecchymata in cute efflorefcunt, bilioſum aut diarrhææ finitimum, aut etiam crudum alui profluuium moderatû: haud ita funeſtum eſſe ſolet. In his enim complures, poſt crudorum ſtatim initio morbi deiectionem, conuulſiſſe obſeruauimus, morbi ſcilicet

perniciæ, quæ in cutem non erupisset, cum crudis & liquidis illis, foetidis tamen & graueolentibus ichoribus, sensim è corde, arteriis ac venis per aluum expurgatâ.

Huius autem varietatis causa est, quòd in illis, alui fluor naturam ab officio reuocet, tempestiuosque eius motus & excretiones interrumpat: in his verò non item, quòd nihil ea in corporis superficiem depellat, sed omnia in aluum deturbet, atque præcipitet. Rarissimè igitur aut vix vnquam contingit vel spontaneum, vel acriori cathartico irritatû alui profluuium in febre pestilenti, quæ bubone & carbûculo stipata sit, salutarem nancisci exitum. At in febribus malignis, quæ citra bubonem, carbun-

culum & ec̃tymata grassantur, quòd sponte incidit, si sensim ac diutius persistit, sæpe liberat, modò intempestivè nec proritetur, nec cohibeatur, sed sensum fluere sinatur, confirmatis interim viribus, tum alimentis, tum medicamentis cor ipsum roborantibus, si tamen vel tardius mouetur noxia materia vel, citius quàm morbi, & virium ratio postulet, sponte supprimitur, propinato rhabarbaro putris ac venenati humoris reliquæ commodè exhaurientur.

*De echymatis.*

Maculæ peste correptis aliquando efflorescunt pulicum aut culicum moribus non dissimiles, nonnumquam etiam multò maiores. Memini enim me sæpius vidisse, quæ uniuers-

sum brachiū, aut crus totum, aut faciē, aut aliam maximam partem occuparent: febrem ferè sequuntur, & tertio, quarto aut septimo die erumpunt, interdum seriùs, interdum citiùs, interdum vnà cum febre exoriuntur, modò cum bubone, & carbunculo, interdum aliquando post, sæpe sine his, aliquando etiam post obitum, veneno in extincto cadauere adhuc debacchante. In febribus malignis sæpe solitariae sunt absque bubone & carbunculo, non minus tamen, quàm si adessent, periculosae. Quæ rubent minus perniciosae existunt, quùm præsertim multæ sunt, & diebus criticis erumpunt, viribus resurgentibus, neque intrò remeantes citò disparent, sed in cute perstant, donec

donec exorto madore, aut sudore earum causa ex halet. At quæcûmque liuidæ, aut nigræ aut venetæ cernuntur, lethales haberi debent. Sunt enim deuicti ac iam penè extincti natiui caloris certissimæ notæ. Has non rarò comitantur, syncope, animi langor, & virium exolutio. Sed & sæpè intrò celeriter recurrunt, nullâ causa manifestâ.

Metuuntur omnia eiusmodi ecchymata cuiuscûmq; sint coloris, si citò diuanescent, sed magis quæ post bubonem, & carbūculum intempestiuè die minimè critico erumpūt. Pessimam enim causam esse oportet, quæ cùm à naturâ in carbunculum & bubonem tota dissiicinō potuerit, suo pte impetu in omnes corporis par-

N



tes vndequaque effunditur.

Hoc symptoma non aliam curationem , quàm pestilens febris efflagitat. Eliciti igitur per antidota & alexipharmaca sudores , vera & peculiaria huius remedia censerì debent: extinctâ enim veneni pernìcie, vel sudore dissipatâ, maculæ, illicò euanescere cõperiẽt. Cauendũ igitur etiã, atq; etiã ne vel ambientis frigore , vel frigidis medicamentis extrinsecus admotis , intrò repellatur , vel cathartìcis reuocetur ad viscera quæ in cutem fertur pernìcies. Videndum etiam ne longiori somno torpidior factâ naturâ , ipsam negligat. Sunt tamen qui vnguento ex hydrargyro corpus inungant, ignari frigidum & humidum hydrargyrum , calamitosam

veneni labem vnà cum humore intrò regerere, mortémque inferre contaminatis visceribus, quòd in multis vsu venisse adnotauì, Doctus Lutetiæ Medicus Simonius hoc remedio in seipso vsus ad digerendum pestilentem inguinis bubonem, illicò vires prostratas sensit, breuíquè bubone delitescente occubuit.

*Curatio Bubonis ex Holl. libello  
de peste.*

Febri pestilenti aliàs superuenit bubo, vel etiam eam antecedit, aliàs succedit eidem: ante febrem bubonem enasci optabilius, quia naturæ valentis significationem affert.

Constat experimento phlebotomiam nocere iam cuncte bubone, & vtédum attrahen-

tibus, cucurbitulis, cauteriis, potu bezoardico, frequenti quidem, si reuomant. Iteretur tertio.

Phlebotomia ( nisi quid dissuadeat ) à venâ cephalicâ, si sub auribus sit bubo, vel extremâ manu, si sub mēto, aliàs ab eadem : deinde à venis linguæ fiet. Si sub alis, à mediâ, si in inguinibus, à saphenâ, sciatricâ extremorum pedum secundum rectitudinem. Ita & cucurbitulæ, à venæ sectione vitetur somnus, ne venenum intrò rapiatur.

*Bezoardica.*

Laudatur plurimùm theriacæ ʒj. cæpa cauato concoquitur, & apponitur loco.

Alij ita coctam cæpam aceto immergunt. Alij vini granatorum, & syrup. de acetositate

citri añ.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . atque ita succum exprimunt, cūmque  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . aquæ tormentillæ, vel succo propinant: materiam amplastri modo buboni apponunt.

$\mathfrak{R}$ . Valerianæ lib.  $\beta$ . rad. ebuli  $\mathfrak{z}\text{iiij}$ . lybistici cum rad.  $\mathfrak{z}\text{j}$ . bulliant in aquâ & oleo chamæmel añ. q. suff. Deinde pistentur cum dicto oleo, & superponantur, vel addatur radix dictamini.

Diachyl.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . Ammoniaci; galbani añ.  $\mathfrak{z}\beta$ . cum oleo scorpionum incorporentur.

Vtendum quóque sanguisurgis, cucurbitulis cum scarificatione, alij omninò circuncidunt, & extrahunt.

Cauteria, si vires valent: tenaculis etiam candentibus extrahunt.

Calcis viux lib.  $\text{ij}$ . cineris  
N  $\text{iiij}$

purgati & cribrati, aluminis rochæ añ. lib. ß. de quibus fiat lixiuium, sed itaut materia induretur, quãtitate parux auelanæ vnguento alicui misceatur.

Catelli gallus, & pulmones animalium.

Scabiosa teritur. Tribus horis retenta carbonem curat. lysimachia similiter.

Cum oleo de scorpionibus anagallis malaxetur: addatur aliquid myrrhæ, aut veteris theriacę, alioqui maturandum apostema; maturatum sagittâ aperiendum, vel theriacâ veteri, quâ parte acuitur, & mollius est apostema.

Si quidem hinc via sit puri, fiat apertio ad modum folij myrthi, vel oliuæ. Caueantur venæ, arteriæ, nerui. Sêctâ

parte si dolor oriatur, lana in oui albumine intincta ponatur. Sic per diem maneat.

Si dolor contingat, deterge prius, & intinge in oui liquore, & modico olei rosacei.

Eschara tollatur modico butyro, oui vitello, farinâ triticeâ mixtis in vnciâ olei rosacei, & vitellus oui simul agitetur.

*Carbunculus.*

Carbunculus à melancholico sanguine est, velut clauus quidam paruus, qui malignior factus pustulas quasi ab igne vrendas, escharam, ardorem, dolorem intolerabilem facit, rubens, viridis, niger. Parui, oblongi deteriores, vicina liuet, ardet in partibus carnosiss & vicinis nobilium.

Bezoardic. emittatur fœces

N iiij

# DE FEBRIBVS

ventris, mittatur sanguis etiam ad lipothymiam, habita semper ratione vitium, &c. Scarifica punctim: emplastrum è pane medio malaxatur cum succo plantaginis, adhibetur, & vt cætera quæ discutiūt modicè & refrigerāt: vel ex plantagine, lentibus, pane cibario coctis in aquâ: granata acida aceto cocta ad putrilaginem, & linteolo extensa, initio ac statu.

Liliorum radix recens emplastri modo, deinde superpone folia caulium, betæ &c.

Bonus armentorum fimus, ficcus ex aquâ subactus. Quidam practici maturant. Gal. prohibet vti pus mouentibus, quia non maturant, sed putrefaciunt.

Scabiosa, cauda equina,

sapphyrus circumagitur carbunculo, deinde retinetur è directo. Albert<sup>9</sup> magnus multos carbones vidit vnus sapphyri gestatione curatos. Tapsus barbatus, theriaca, Mythruidatum. Sed remedia celeriter exarescunt; subinde itaque commutanda: sanguifuga, gallinæ,

Defensiuæ circa locum.

℞. olei ros. ℥iij. aceti ros. ℥j. boli armenæ quant. suff. Ad inspissandum.

℞. vnguenti popul. olei. ros. & myrtill. añ. ℥ij. ini granato. ℥iβ. boli armenæ, terræ sigillatæ añ. quod sufficit.

Possunt emplastra malaxari cum succo plantaginis, cotula foetida trita, circumponitur. Supra verò sterco humanum calidum, vel vitellus oui recēs

N v



# DE FEBRIBVS

agitetur cum sale benè trito. Nasturtium vel vrtica cum sale teratur, & malaxetur cum oleo liliaceo. Allium tritum per se, vel cum pipere, & auelanarū nucleo, detractâ pelle.

Terebinthina cum nitro, carne passularum, cum sale vel stercore passeris, columbarum.

Mel & oleum cum sale trito cocta.

Corturturis recenter detractum & deuoratum singulare remedium. Fots ante scarificationem, & alia. Chamæmeli ℥iij spicæ celticæ ℥ij. maioranæ ℥ij. bulliant in aquâ, cum spongiâ fiat fots deinde ventose affigantur cum multo igne. Fiat idem fots, tum scarifica punctim, & cucurbitula apponatur, vbi res vrget.

*De symp. febr. ex Holl. lib. 2.  
de morbis internis.*

Quæ cadunt in febres, vt & alios in morbos, symptomata, trium sunt generum: aut enim actiones læsæ, aut excrementorum & euacuatorum excessus, aut affectus corporum seu mutatae existunt qualitates.

Primi generis sunt, somnus, vigilia, delirium, capitis dolor, syncope, sitis, deiecta appetentia, rigor: secundi fluor, obstipatio, sudor, vomitus, hæmorrhagia: tertij, linguæ scabrities, nigredo, icterus, & cætera id genus. Leuiores sunt interdum, & quæ medicum minus debeant exercere; aliàs grauiora, & quibus maiore cum diligentia, & sollicitudine, quàm febribus, ipsis sit consulendum. Dictum quidem est antea de

iis febrium accidentibus, quæ ipsarum generationem necessario sequuntur, nec tamen curationem immutant ; nunc ea traduntur , quæ præter communem aliorum sortem, curationem ad sese trahunt, quòd causarum vicem obtineant. de his fusius Galen. lib. 12. metho.

*De Vigilis ex Fernel. cap. 19.  
lib. 4. Pathol.*

Vigilias inferunt causæ omnes, quæ somnū & quietem interpellant, dolor, æstus, oppressio, sitis, & quæcunque minimū infestæ sunt & laboranti graues. Plerūmq; etiam si ne istæ quidem molestæ sint, somnus tamen nullus obrepere potest. Id ferè obtingit quū calidus acerque vapor cerebri substantiam magis quàm me-

ninges ferit, eamque exsiccat  
& calfacit, spiritusque supra  
modum attenuat & variè dis-  
pergit. Id ipsum quòque citra  
magnum ardorem euenire com-  
pertum est, quoties pernicio-  
sa qualitate cor obteritur. Sõ-  
ni modus diligenter obseruã-  
dus: Nam in acutis morbis cõ-  
sopiti laborãtes, quum exper-  
giscuntur: plerumque nec me-  
minerunt, nec se dormuisse pu-  
tant.

*Curatio immodicæ vigiliæ ex Holl.  
lib. 2. de morb. inter.*

Græci sub horã somni ma-  
nus & pedes ad articulos vin-  
culis constringunt, dum defa-  
tigentur. Soluunt vincula, sub-  
ducunt lumen, imperant silen-  
tium. In ratione vinculorum  
animaduertendum, ne corpus  
arthriticum sit, aut sint vlcera

ad articulos. Sic enim ad alia remedia confugiendum est.

Anacollemata, quæ frontalia appellant, ad repellendū com-  
moda, ex olei rosacei. ℥j. aceti  
℥ij. cum oui candido.

*Aliud.*

℞. olei vio. & rosa añ. ℥β. aque  
ros. vel beton. ℥ij. agitentur  
cum oui albumine. Fortius  
erit si Gr. vj. vel eò plus opij  
addideris aut ℥ij. populeonis  
Sed in vsu anacollematum ha-  
benda ratio naturarum. Nam  
pueris, mulieribus, epilepsiæ  
obnoxiiis, & mollioribus cor-  
poribus eiusmodi refrigeran-  
tia stuporem inferunt, lædunt-  
que memoriam in reliquam  
vitam: in iis verò, qui remedia  
sustinere possunt, innouanda  
sunt sæpius: statim enim inca-  
lescent.

℞. capit. 3. papauer. in pul-  
uer. redacta commisce oui al-  
bumini.

Benefiet, si albumen oui ex  
aquâ rosaceâ prius agites , &  
despumes.

*Aliud.*

℞. olei papauer. albi ʒiʒ. po-  
puleonis ʒʒ. albumin. ouorum  
ij. vt antè, despumat ʒij. lactis  
muliebris ʒʒ. præferunt in hoc  
lac muliebre, si nutrix albo  
colore est & puellum nutrit.

*Frontale ficcum.*

℞. quat. sem. frig. añ. ʒj. sem.  
papau. ʒij. florum nenuphar.  
viol. anethi añ. p. i. fiat ex om-  
nibus puluis, qui inoluatur  
in linteo duplici : deinde per-  
fumetur cum aquâ rosarum,  
& betonicæ, aut cum vino al-  
bo diluto his aquis.

# DE FEBRIBVS

*Aliud.*

℞. nenupharis ros. viol. añ.  
p. i. cort. rad. mēdragoræ ʒiʒ.  
femin. papauer. albi, coriandri  
añ. ʒj. cocassentur crassiusculè,  
inuoluantur & perfumentur, vt  
prius. *Potiones.*

℞. syrup. papa. de nenuph.  
añ. ʒ. vj. decoctionis lactuca-  
rum ʒij. capiat hora somni.

*Aliud.*

℞. Lactuc. p. i. Dactylos  
tres, caput vnum papaueris  
fiat decoctio ad ʒiiij. cum ʒj.  
syrupi rosa. fiat potus.

*Vel.*

℞. dactylos duos cum ca-  
pite papaueris, fiat decoctio  
ad ʒiiij. in colat. diff. saccha.  
ros. ʒiiij. - Conuenit vbi destil-  
latio in pulmiones cum vigiliis:  
ac ferè commiscemus ea quæ  
adstringunt, vbi fluxio est, vt

in dysenteria.

℞. sirupi de papauere ℥j.  
diacodij siue speciebus ʒj. a-  
quæ ferratæ ℥β. detur horâ  
somnia. Conuenit & syrupus  
rotatus, alias per se, alias cum  
aliis. Olfacere oportet oleum  
de semine lactucæ, de nenu-  
pharæ, violarum, cucurbitæ,  
aut ex his nares inungere. Alio-  
qui refrigerantia, vt lactuca,  
flores violarum, nenupharis,  
femen & capita papaueris, se-  
men albū hioscyami, coquan-  
tur aquâ: vapor auribus & na-  
ribus excipitur: spongia in his  
immersa & expressa subinde  
naribus admouetur. Conue-  
niunt molles frictions plan-  
tæ pedum, linteamina benè  
munda, instratum cubile refri-  
gerantibus, susurri facti, idem-  
tidem infusa aquâ: sunt qui



abrafo capillo humectant caput spumâ feri lactis feruefacti. Melius fuerit oleo rosaceo perfundere.

Alij è floribus croci, decuplis staminibus, aquâ distillât, eius aquæ ad ℥iij. propinant horâ somni. Quidam etiam probant manus & pedes ablui ex decocto refrigerantium.

Bonum quóque fuerit hordeata, lac amygdalarû dissoluere ex decocto lactucarum, capitum papaueris & similium, iuscula alterari cum multâ lactucâ, nodulos quóque fieri, qui iusculis incoquantur, vt:

℞. quat. frig. maio. portul. añ. ʒß. fiat nodulus. Vbi verò minimùm somniculosi sunt, exprime succum è radice fœniculi, & indes naribus, aut spongiam imbues aceto, in

quo priùs concisa radix , fœniculi, hyssopus , nux moschata, aut quid simile coxerit.

*De siti ex Fernel. cap. 19.*

*lib. 4. Pathol.*

Sitis quidem fit interiore ventriculî tunicâ vel ardore inarefactâ, vel imbutâ nîtroso & acri calidóque humore. Illa tamen potu extinguitur. Hæc verò minime , etiamsi totus venter humore perfundatur ac turgeat : sæpe enim vel ore madido grauis existit. Sola corporis æstuatîo nisi hæc interueniant, rarò siti excruciat. Nam interdum corpus febris exardescit sine siti, non quod ( vbi vulgò creditur ) frigida destillatio ventriculum proluat , sed quòd ardoris causâ longius absit à ventriculo.

DE FEBRIBVS

*Curatio sitis ex Holl. lib. 2.  
de morb. intern.*

Somnus sitim sedat à siccitate, declinationibus tempestiuis: sanguinem enim intrò colligit, vnde siccitas temperatur. Vigilia verò sitim lenit à calore; calorem, enim foras excludit. Ideoque quicumque merum largius hauserunt, ac per fumos & vapores calidos sitiunt, iis non modò frigida potus, sed etiam vigilia remedio est.

Sedandæ siti ardentium, & eorum, qui calido & sicco laborant, cōueniunt quæ refrigerant, & humectant quale est dilutū oxycratū, id est aceti modicum, eiusque tenuis & benè puri, multæ aquæ mixtum, vt facilè bibi possit.

Acriore enim vtēdum erit,

vbi p̄tuita falsa est, aut alioqui humiditas iuncta calori, vt in hydropē. Aqua frigida, si nēque infirmitas visceris, nēque cætera prohibent, tempestiuē data, efficacissimē sitim extinguit, quā calor & siccitas faciūt.

Quod si ab aquā frigidā noxa meruit, quintā parte tepidę vini aquosi, iulepi violati, aut rosati, parte subdecuplā sacchari temperari potest. *Aliud.*

℞. seminis lactucæ & cucumer. an. ʒss. liquirit. recentis & rasæ ʒj. bulliant in vj lib. aquæ. Aqua refrigerata per se vel cū modico aceti, vt prius, aut aliis p̄ximē dictis, bibatur hordeatū mūdātum & excorticatū in quadruplā aquā bibatur. Ptisana vulgaris benē cocta ex hordeo mundato, recenti, succulēto, excorticato,

& glycyrrhisa similiter recenti,  
 & rasa, vtilissima est. Sed hæc  
 Medico animaduertēda sunt,  
 alioqui sitim facit, non extin-  
 guit. Cydonia & pyra humi-  
 dora, cucurbita, cucumer in  
 rotulas cōciduntur immitun-  
 tur vasi aquâ frigidâ pleno, vas  
 in puteum ita demittitur, vsus  
 tempore aqua bibitur, cū  
 vehemens ardor est. Mel ro-  
 satum more veterum præpara-  
 tum, aut saccharum rosatum,  
 sæpius refusa aquâ rosacea fa-  
 ctum, in octuplâ aquâ dissolui-  
 tur. Cydonia pruna, extrema  
 lactucæ ac portulacæ, capreo-  
 li vitis, ramenta cucurbitulæ  
 & cucumeris, aquâ plantag.  
 vel rosaceâ macerantur, & ore  
 continentur. Similiter & gra-  
 natorum succus, syrupi violac.  
 ℥j. in ℥iiij. decoctionis lactu-

æ. Iulepus violatus, rosatus,  
 vel ex aquâ & saccharo factus,  
 saccharo quidem communi,  
 vel violato. Vinum granato-  
 rum, syrupus limonum & simi-  
 lia cum aquâ hordei, decocto  
 liquiritiæ & similibus propinā-  
 tur. Pillulæ sunt ab antiquis  
 commendatæ sub lingua reti-  
 nendæ.

℞. semi. cucumeri ʒiiij. gūmi  
 tragacanthi ʒij. gūmi dissolua-  
 tur oui albumine, semina trita  
 commisceantur, fiant pilulæ.  
 Siccentur in vmbra, paulatim  
 deglutiantur. Circa guttur  
 inunctio ex oleo rosaceo cum  
 aqua, aut succis semperuiui,  
 solani, vmbilici veneris, lactu-  
 cæ, acetosæ, portulacæ, muca-  
 gine psyllij, aliquot granis ca-  
 phuræ, in quibus linteolum  
 subtile & rarum subinde ma-

defiat , ac frequenter apponatur. Conueniunt & ea , quæ contra æstum dicta sunt cap. de febre ardente.

*De lingue scabritie & nigredine  
totiusque oris ex Fern. cap. 19.  
lib. 4. Patho.*

Lingua nonnumquam sine fiti arefcit in febre, perinde atque in iis qui per sanitatem hiant ore obdormiunt : arefcit & ab immodico æstu & à calido acriq; vapore in fauces, in os , & in palatum sublato. Huius plerumque tanta vis eft, vt linguam scabritie exasperet, nonnumquam & hanc diffundat. Si crassiusculus vapor eft, aut pituita è ventriculo in os redundat , aut è cerebro procumbit, crassescens ea vi caloris & obdurescens linguam ac dentes

dentes plerúmque , & gulam totam lentore obducit. Hæ ipsæ causæ quum fauces , œsophagique introitum obsident, & viam cibi , vel siccitate , vel lentore coangustant , deglutiendi facultatem inuehúnt. Numquam tamen deprehensum est his solùm ex causis ( quod tamẽ plurimj metuúnt ) omninò fauces præcludi.

*Ex Holl. lib. ij. de morb. inter.*

Lingua scabra hydrelæo tepido sæpius fouenda est ; sed oleum dulce sit, & benè lotum aquâ purâ , nullâ qualitate vitiosa. Alioqui tantùm aquâ tepidâ vtédum est , in quâ , si vis , præcoxeris semina cydoniorum , althæ , maluæ. Posteaquã verò abluta lingua est , scabri-

O



tics & humor qui inhæsit , fat-  
tis aspero linteo , spongiâ,  
cæruleo panniculo, cochleari  
argëteo, vel ad id parato instru-  
mento detergenda, abraden-  
dâque: Sæpe enim veluti ni-  
grâ fuligine obducta est lingua  
quæ pertinacius hæret, nisi a-  
bradatur. Idq; ferè fit ab adu-  
stâ bile , & sursum latâ , vnde  
iis & deliria, & profluvia san-  
guinis ferè contingunt. Au-  
relianus spōgiâ, aquâ tepidâ,  
imbutâ abstergit simul, & hu-  
meâtat. Quod si humeâtandi  
consilium vincit, quia ficcior  
lingua est, lini semen , cydo-  
norum, altheæ, maluæ, psyl-  
lij, portulacæ, mixaria seu se-  
bestem, altheæ radices, aliâq;  
eius generis , quæ humeâtant  
& emolliunt, in aquâ prius co-  
quenda sunt, in quâ melle lin-

teolum subinde inculcabis, atque ita linguam remollies: vbi verò scabrities vincit, atque adeo abstergendum magis asperiore linteo, panniculo illo cæruleo, extremitate baculi alligato, vel spongia vteris, & in præscriptâ aquâ aliquid sacchari candi dissolues, atque vbi satis humectatum, atque repurgatum os fuerit, frigidâ coluendū est. Cautio ne phreniticis, & delirantibus, dum os abluis, in os digitū inducas, mordicant enim, & digitum abscindunt. Cornelius Celsus penicillo è carpto linteolo & constructo, ne dissipetur, linguam deterget, quam prius aquâ calidâ inculcât; Deinde melle vngit, & oleo rosaceo. Mel enim, purgat & deterget. Rosaceum reprimit & sicce-

## DE FEBRIBVS

scere non finit. Alioqui butyrum recens sæpiùs ex aquâ rosaceâ ablues, cui deinde saccharum commiscebis. Quòd si sola ariditas, cerato rosaceo liquidiore vtitor. Saccharum candum retentum ore humectat & deterget. Paulus Cēlso ferè cōsentit, & rosaceum cōcorporatum melli plurimùm commendat. Sumach incoquatur mulla, hinc scabritiem detergebis. Pruna damascena & sebestem incocta, aquâ rosaceâ humectādo conueniūt, & reprimendo, succus portulacæ, eiusque folia ac reliquæ id genus herbæ prius enumeratæ cap. de siti.

Archigenes salc indo vtēbatur, nos saccharo cando.

Auicennas baculo rusci, aut salicis deterget: oleo amygdala-

lino cū modico saccharo optimo humectat & deterget. Quòd si oleum odiosum est, lacte amygdalino vtendum erit. Sed aliquando profundius scabrities inhesit, cācrum vulgus appellat. Tum chirurgus vti oportet, qui depressa linguâ, instrumentum ad id conueniens profundius immittat, atque detergeat, ex quo gargarismis vtendum est.

℞. Aquæ hordei aut ptisanæ benè præparatæ ℥iiij. sacchari viola. sacchari candi añ. ℥β. vel,

℞. hordei mundati ℥j. Tragacanthi albi: semin. Cydoniorum, seminis maluæ, liquiritiæ recentis mundatæ, succi eiusdem añ. ℥β. fiat decoctio in aquâ purissimâ ad lib. β. In expressione dissol. penidiorū ℥ij. fiat gargarismus, quo te-

O iij

pidè vtatur. Aliàs:

℞. faccari candi, tragac. albi,  
gūmi arabici añ. ʒij. sem. psyll.  
Cidoniorum, portulac. añ. ʒß.  
Conseruē violar ʒß. vniantur  
omnia: deinde dissoluta in iu-  
lepi violati quātitate sufficien-  
ti, gargarismum faciunt contra  
scabritiem arteriæ, totiúsque  
oris interioris. Collum verò,  
quâ maximè parte venæ sunt,  
& arteriæ, illinatur subinde  
hoc vnguento.

℞. Olei viola. sæpius loti in  
aquâ violarum ʒij. butyri re-  
centis sæpius loti ex aquâ ro-  
sarum ʒß. fiat vnguētum. Vul-  
gus vtitur foliis linguæ canis,  
quæ collo circumponit, aliisq;  
herbis plurimis frequēs quò-  
que illi est aqua caprifolij &  
arnoglossi, similiter & ompha-  
cio aliquando vtitur. Decum.

bere oportet in alterum latus. Sæpius & ore hiantibus celerius lingua exarescit. Sternutationes linguâ humectant, quia violento motu è vicinis partibus humidis, humiditas in os exprimitur.

*De capitis dolore ex Fernel.*

*cap. 19. lib. 4. Pathol.*

Capitis dolor in febre subiectarum partium, maximèq; præcordiorum consensu fit, in quibus exæstuans humor multum de se vaporem in caput per medias quasque regiones (est enim corpus omninò perspirabile) emittit. Hic verò meninges & pericranium, vel calore & acrimoniâ feriens, vel copiâ distrahens dolorem parit. Nonnumquam & è

O iiij

DE FEBRIBVS

venis arteriisque maioribus  
furfum impulsus tenuior san-  
guis temporum pulsantem fa-  
cit dolorem. Omnis autem ex  
febre genitus capitis dolor aut  
tempora aut frontem, aut om-  
ninò priorè capitis regionem  
adoritur.

Qui verò aut in occipitio  
aut in vertice, aut circum au-  
res figitur, etiamsi cum febre  
excandescat peculiarem cau-  
sam habet in capite, nèq, sym-  
ptoma est febris.

*Ex Hollerio lib. 2. de morb.  
intern.*

Veteres roso capillitio asper-  
sionibus plurimùm utebātur,  
& ex alto infusis liquoribus  
in eas partes capitis, quæ per  
futuras anteriores humor in  
caput descenderet. Uteban-

tur ferè oxyrhodino, rosaceo cum aceti modico, siquidem calidior febris, talisque aëris conditio. Frigidior verò corporis habitu, & hyeme chamemelino cū aceti quintâ parte, quod propè fiet si ℥ij. aceti, olei ℥j. commisceas. Sed nunc ferè anacollematis, seu frontilibus vtimur, quæ frontem & tempora comprehendant ex eadem materiâ.

*Vel.*

℞. olei rosarum ℥ij. olei cōmunis, vel chamæmel. ℥ß. æstate frigidis, atque vbi feruentior febris est: vbi verò mitior febris, nec cœlum feruet, modò tepidis, modò calidis vten- dum est. Aliquando proximæ mixturę succum polygoni cōmiscemus. Nonumquam capita papaueris in oleis elixa-

O V



mus æstate, & vehementiori febre: alioqui serpillum, mentham, betonicam, saluiã, anethum, pencedanum, & similia. Perseuerante dolore cataplasmata fingenda sunt.

℞. farinæ hordei ℥. ij. malaxentur cum succis fœniculi, & olei rosacei añ. quant. suff. fiat cataplasma, quod in totam frontem & tempora extendatur. Quòd autem & subinde remedia cōmutari, priusquam nimium incalescant, quòdque olea nec rancida, nec grauius olentia, nec salia esse oporteat, iam sæpe dictum est.

Cornelius Celsus rosas in aceto macerat, fascia in eo aceto madefacta maceratas rosas inuoluit: frōti, & temporibus apponit, sæpe innouat, alioquilana in eo aceto inculcata

vim remedij conseruat, quòd  
& in aliis remediis fieri potest,  
ne celerius incalescant, sepiùs-  
que commutanda sunt.

Alij pane ex psylij & simi-  
lium succo subactò cataplasma  
fingunt. Nonnulli eandem  
micam panis cum foliis hyo-  
scyami conterunt, vel papa-  
ueris recentis, deinde oxyr-  
hodino commiscent. Absti-  
nendum verò assiduâ potatio-  
ne, collutione immodicâ, lu-  
ce, calore, colloquiis, ingratis  
odoribus & vaporosis, clamo-  
ribus, strepitu, & vehementi  
animi motu. Auicennas, &  
Arabes hac irrigatione vtùtur.

℞. florum chamæm. ℥. ss.  
furfur. viola. rosarum añ. ʒss.  
fiat decoctio. materia sacculo  
excipiatur, qui subinde made-  
factus in decocto exprimatur,

O vj

DE FEBRIBVS

deinde fronti ac temporibus  
apprimatur.

Neotericorū formulæ sunt.

℞. Olei rosarū ʒβ. olei violarum & lactis mulieris añ. ʒij. aceti albi ʒj. panniculus, in eā mixturā, inculcatus applicetur fronti & téporibus. *Aliud.*

℞. aquæ rosarum & damasci añ. ʒi. aquæ nenuphar. ʒβ. misce, similiter vttere.

Vitis capreoli & folia concisa, telâ, inuoluta, & imposita dolorem sedant, & somnum conciliant : similiter & reliqua materia, quæ refrigerat. Videndū tamen, ne nimium refrigeremus, ideóque & aceto, & aliis eiusmodi, sed illo maximè interdictum est, ne quis, videlicet, solo vtatur. Nā præter quam quòd nimium refrigerat, nervis etiam inimi-

cum est, atque iis multò magis abstinendum est in pueris, mollioribus corporibus, & cœlo frigido.

Auicennas in dolore capitis à febre abstinet stypticis refrigerantibus, quia timet ne inde materia cōpingatur, & cerasscescat nimium: alioqui materia exprimatur vbi catharus calidus est.

*De delirio ex Holler. lib. 2.*

*de morb. internis.*

Delirium in vigore febrium multosprehendit ob capitis repletionem, inquit Gal. comment. in sen. 36. sect. 3. lib. 6. epidem. de eo maximoperè sollicitum esse Medicum minimè oportet, nisi fortè metuatur, ne in phrenitidem concidat, vt ferè fit calidioribus in naturis, quæ ingentiore fe-

briū ardore exercētur. Quamquam verò sæpius leuius est symptomatis id genus, huic tamē occurrere expedit, quia mente constare bonum. Si ergo à vaporibus acrioribus sursum latis fiat, sumenda & ad-mouenda sunt, quæ illorum ascensum prohibeāt, tum quæ discutiant. Qualia multa inuenias cap. de phrenitide lib. 1. Si humores in vasis calidi huic malo materiam suggerant, secunda vena. Si feces in intestinis restitantes, enemata subdenda. Discutient materiam capite contētam catelli exenterati, & calidè appositi.

*De sudore ex Fernel. cap. 19.*

*lib. 4. Pathol.*

Sudor non modò febrium intermittentium, sed & conti

nuarum & aliorum quorūdam morborum est communis: huius materia est humor vel copiā vel qualitate grauis per cutis spiracula manifestè affatimque profiliens. Hinc verò quod calidus sit aut frigidus, mitis aut acer, tenuis aut crassus, atque viscosus, foetidus aut suauis, humoris qui hunc protulit genus exprimitur.

Erumpit sudor aut naturæ vi, quiddam superuacaneum robore expellentis, aut sponte proprioque impetu; illum naturalem, hunc symptomaticum appellant. Qui decedente febris intermittens accessione profluit vberius, & qui in continuarum febrium crisi emanat naturalis est: præter naturam verò & symptomaticus, qui quouis modo aliter

# DE FEBRIBVS

alióue morbi tépore profilit.  
 Hic ferè primùm incipit à capite, ac deinde à reliquis etiam partibus sensim emanat. Solum enim utilis & secundum naturam is habendus est, qui expurgatæ aluo succedit, quæ iam vacuatâ crassiore morbi materiâ, reliquam tenué per corporis summa dissipat. Qui verò vel morbi initio, vel quouis alio tempore, vel ante cōcoctionem, vel ante crisim exierit, irritus est atq; symptomaticus, & cui nulla morbi fida solutio committi potest.

*Curatio sudoris ex Holler. lib.2. de morb. intern. cap. de sudore.*

Sudores verò in febribus aliàs cohibere aliàs excitare oportet, Critici, siquidem resistunt, excitari debent: ac

ferè resistunt , vel quia copiosior materia est , vel qualitate crassior & lentior : alioqui externa causa est. Propterea cōsuetudo est, vt syrupum acetosum cū ptisanâ , vel aquâ hordei calidâ imperent , alioqui ptisanam vel aquam hordei saccharo conditam. Atque hæc calida imperentur , vt citius penetrent in corpus. In summâ quæcumque vim habent aperiendi, nec adeò calefaciunt , mouendis sudoribus imperari debent : atque vbi materia crassior est, minúsque viscida , decoctum hyssopi, thymi, pulegij & similium , vel oxymeliti, vel syrupo acetoso miscendum est.

Verùm in sudoribus etiam criticis modus quidem esse debet , quemadmodum & in



reliquis omnibus criticis excretionibus.

Modum verò tibi indicabit pulsus, qui per eiusmodi excretiones vehemens & magnus. Quo igitur tempore talis permanet, nihil ab excretionē tibi metuendum est: vbi verò cœpit imminui & languescere, sistenda hæc excretio est. Historia est apud Gal. libell. de usu respirat. Imperitus quidam medicus sudantē adolescētem in balneum deduxit, & extinxit, præter modum citatis sudoribus.

In syncope copia grauante, inflammationibus viscerum, principiis morborum acutorum sudores mali: Etenim naturæ imbecillitate, non robore effluunt. Ab animi quóque molestiâ, conuulsionibus, ma-

gnis doloribus, sudores commoti cohiberi debēt, vt etiam qui resoluti corporis habitu diffuunt. Insudoribus remissis néque satis fluentibus, melius est aquam guttatim cadere quàm tenuiter & parū corpus madefacere.

Diapasmata Græci vocant, quæ ad sudores insperguntur, vt alipasmata, quæ inunguntur magisque cohibendis sudoribus. Diapasmata ex materia refrigerante & adstringente, vt est rosarum siccarū puluis, terra Samia, Cimolia, creta, alumen scissile, plumbum exustum, gypsum lotum, mala punica. Hæc singula commixta, vel per se subtiliter trita corpori asperguntur, vel adstringente oleo commixta inunguntur. Ad sinistram māmam,

# DE FEBRIBVS

& totum vētrem remedia adhibenda sunt, ac subindemutanda sunt. Cæterùm vbi tumor præter naturam in hypochondriis, adstringētibus abstinere oportet, vtendūque pane ex rosaceo subactō. Alioqui farinam volatilem ex aquâ vel rosaceo subactam hypochondriis impones, atque remedia, quæ sudores cohibent fugere oportet.

Aëtius cataplasmatibus refrigerantibus sinistram mām & totum vētrem comprehendit: siue gmatibus verò aut diaplasmatibus, id est, puluisculis, collum, thoracem, alas, inguina conspergit. Corpus quóq; mentilandum est, atque leuandum stragulis. Possumus succo plantaginis, portulacæ, & similium media corporis irri-

gare, vniuersum corpus ceratis ex oleò astringente inungere.

Paulus resistentem sudorem, criticum aut remissum fotu, quiete, calido clystere, sorbitionibus, somno deniq; adiuuat.

Sudores ab omni molestiâ, conuulsione & similibus, extremitatum, ligaturâ, fotu extremorum, vestimentis lanceis compefcit. In summâ nullus sudor vi exprimendus est, sed vbi natura eam excretionem molitur, tum quidê adiuuanda est. Certissimum indicium sudoris salutaris è pulsu colliges, qui magnus & vndosus esse debet; siquidem sudor salutaris futurus est: ac præter cætera animaduertere, quæ sudoris causa extiterit.

## DE FEBRIBVS

Si enim præter naturam est, qualis est dolor animi, molestiâ, cõuulsio, interior inflammatio & similia: sudor quidem resoluit corpus, non leuat: itaque cohibendus est. Contrà verò si naturæ victoria est, pulsus magnus erit & vndosus, néque tum sudor cohibédus, sed si resistit, incitandus, dum incipiat pulius languescere. Signa prognostica, è quibus præfagias sudorem, iam antè descripta sunt cap. de febre ardente.

Sudor qui grauitè olet, putridâ corruptâmq; materiâ ostendit. Suspectus est, qui non soluit febrem, qui non minuit symptomata, qui alio die, quàm critico, existit.

*De morbo Regio ex Holl. lib. 2.*

*de morbis intern.*

Quibus in febribus morbus regius antediem septimum accidit, malum, inquit Hippoc. Tum scriptum ab eodem primo de morbis popularibus, multos seruatos, quibus die quarto morbus regius accidisset, & lib. de ratione victus acut. Morbus regius ante septimum si cum horrore salus, si sine horrore mors. Quæ quia pugnare videntur, meminisse morbum regium ante septimum ferè exitiosum nisi sequat excretio, qualis est fluor sanguinis è naribus, alui profluuium, vrina multa, sudor, vomitus, & similia.

Alioqui naturæ infirmitas ostenditur, grauis intemperies, & obstructio hepatis, eiusdem inflàmatio, aut scirrhus. Quòd si initio morbi natura

concidit, exigua spes reliqua  
 est. Post septimum diem vero  
 siquidem criticus est, salutaris  
 est. Post septimum significat  
 sudorem scripsit Hippocr. lib  
 de indication. Si igitur post  
 septimum morbus regius fit  
 & criticus est, expectanda sa-  
 lus: multò magis si qua excre-  
 tio critica coniuncta est: vnde  
 leuetur natura, minuatur fe-  
 bris, eiusq; symptomata. Verù  
 aliquādo & morbus regius fit,  
 & sequitur excretio, & mori  
 contingit. Ita Hermippus in  
 Epidemiis cum à morbo re-  
 gio abunde excreuisset per al-  
 uum, mortuus est.

Phanagorę seruis tertio die  
 auriginosus nihil excreuit,  
 mortuus est. Heraclides & alij  
 permulti sexto die auriginosi  
 perfructi sunt: quibus secuta per  
 vesicam

vesicam purgatio, turbata aluus est, vel profluxio sanguinis è naribus.

Præter remedia, quæ proprio cap. de morbo regio descripta sunt, conueniunt, balnea dulcia, vnctiones ex oleo chamæmelino, anethino, irino, aut cui rosmarinus incoctus sit.

Potiones quæ aperiant, rarefaciant, moueant sudores, quæque partim cap. de variolis, partim cap. de sudoribus descripta reperiuntur: atque vbi extincta febris est, liberior vsus est aperientium. Oculis conueniunt fots ex aquâ tepidâ, in quâ sūmitas fœniculi, flores chamemeli, anethi, rosmarini efferbuerint, atque eadem aquâ, & facies & corpus vniuersum ablui potest.



DE FEBRIBVS

Oxyſacchara, Granatorum ſuccus cum modico melle albo, vel ſaccharo oculis inungitur.

Errhina imperantur.

Ablutio faciei ex aceto albo tepido. Errhinorum vſus in balneis ex aceto acerrimo ſcylitico, ſucco naſturtij, maioranæ, betæ, fœniculi, roſmarini.

Elaterii morentum in lacte muliebri diſſolutum.

*De cibi ſaſtidio ex Fernel. cap. 19.  
lib. 4. Pathol.*

Cibi ſaſtidium aut febrem antecedit, aut primum eius ſymptoma exiſtit. Huius enim cauſa multiplex. Nam & ſola corporis perturbatio & omnis ventriculi perſuſio à quouis humore, qui aut ipſū quaſi ſaturat, aut alienâ qualitate ap-

petendi vim illius confopit & obruit: nec non corruptus vapor in os ventriculi vndeliber efflatus, aut sola infensa qualitas eò se inferens appetentiam euertit.

*Curatio dissolutæ appetentiæ ex*

*Holler. lib. 2. de morb. inter.*

*cap. de dissolu.*

*apptentiæ.*

Atque interim coguntur vti clysteribus qui nutriant, vbi nimium deiecta appetentia, nihil assumit æger, aut omnia remouit. Similiter & cibum non sentientibus, & cardiacis, iuscula caponũ, pullastrorum cum modico saccharo, hordeatum & amygdaloga.

Oribasius alicam, triticum, far, furfures, panes coquit, & decocta infundit nutriendo, & stercorea duriora excludendo.

P ij

## DE FEBRIBVS

Meliúsque fuerit , priusquam nutriētem clysterem iniicias, alio clystere intestinum repurgare, ac quantum fieri potest, & paulatim & in profundum nutriens clyster infundatur.

Aëtius oua confracta in pti-  
sanæ cremore, aut alicæ, iniicit  
vacuo intestino, hoc est, benè  
repurgato veteri stercore. Nūc  
vitellum oui in hordeato, la-  
cte amygdalino, iure carniū  
dissoluemus. Potus sit iulepus  
rosatus, distillatum: sed quia  
dulcia sunt, quarta pars vini  
granatorum adiici debet. Ge-  
latina cum eodem vino, vel  
granis acidi granati, granatum  
quóque acidulum, cum modi-  
co saccharo exhibeatur. Iule-  
pus factus ex succo depurato  
capreolorum vitis. Syrupus  
de agrestâ cum aquâ coctâ fri-

gidâ. In conualescentibus sæpe humor aliquis reliquus est imbibitus ventriculo, vnde deiecta appetētia. Eos scripsit Hippocr. egere vacuatione.

Vacuatio olim ex hierâ: nūc ex rhabarbaro. Optimum fuerit vacuans medicamentum imperare ex decocto eorum, quæ detergent, & maximè ciccerum rubrorum, absynthij, hordei & similium. Cinamomum aceto scyllitico maceratur, estur matutino.

*De Nausea & Vomitu ex Fernel.  
lib. 4. cap. 19. Pathol.*

Nausea atque vomitio causas habet aut humorē, aut vaporem, aut qualitatem, quæ modò nimio perē relaxat & emollit, vt pituita dulcis, modò expultricē facultatē copiâ vel acrimoniâ extimulat, vt bilis

genus omne, modò pñicie facultatis ipsius robur aut infestat, aut dissoluit, vt maligna, atque pestilens febris qualitas. Quum igitur causarum aliqua vel in ore ventriculi, vel circum tunicas eius tam vehemèter impingitur ac hæret vt excuti ipsa minimè possit, si exinanitus est vētriculus, nauseam solùm: sin verò potu ciboue confertus est, cibi vomitionem mouet. Quum autem causa ipsa nusquam obhæret, sed aut in ventriculo fluctuat, aut in eum aliundè confluit, humoris aliàs biliosi, aliàs pituitosi vomitionem ciet.

*Curatio Vomitus ex Holle. lib.1. de morb. intern. cap. 31. de cholera.*

℞. Iulapij rosati ℥iij. succi granatorum ℥i℥. misce, vtatur breuib; interuallis, duob' aut

tribus cochlearibus. Conueniunt & fyrupi, rosatus, myrthinuis, de Cydoniis, de granatis, & fimiles in causâ calidâ. Idem quoq; in causâ frigidâ, sed cōspersis pulueribus spicę, cinamomi, nucis moschatae, & similibus. Alioqui syrupus de menthâ, de absynthio, & fimiles.

Oportet autem assumi cochleari, breuib<sup>9</sup> interuallis, & sine aquis. Largior enim potus hic non conuenit.

Laudatur remedium ab antiquis ex vini granato. ℥ij. succi menthæ depurati ℥β. & utatur cum cochleari, ut prius dictū est. In causâ frigidâ, vinum optimū, tenue & odoriferum aliquando satis esse potest.

Imperabis quóq; ut granatum integrum, acidum, dulco-

P iij

ratum cū saccharo rosato odoratur, æger fugat interim: eiusdem quóq; grana commāducet. Cōspargenda facies aquâ frigidâ, aqua rosarū per ic, vel in frigore, adiecto vini odoriferi momento, vel moschi modico. Vtendum quóq; iis, quæ exteriùs admouentur stomacho, qualia sunt hæc.

℞. santalorum rubrorum ros. añ. ʒij. galliæ moschatae ʒß. Caphuræ gr. vj. madeant in aquæ rosarum. ʒiiij. aceti ʒiß. panniculi in hac miscellâ mersi & expressi, quantum fieri potest; frigidi toti vētriculo applicēt.

Potest inūgi stomachus oleo rosato, de cidoniis, de spica, de absynthio, vt res exigit. Quòd si timetur nimia refrigeratio, miscellæ suprâ dictæ, succ<sup>o</sup> mēthæ, absynthii, aliquid quoq; cinamomi aut vini austeri odo-

riferi cōmisceri potest: Mastichis ℥ij. aut iij. cū oui albumine, cum oleo cydoniorū, aut conuenienti dissoluūtur. Inde fit emplastrum, quod extendi debet in alutâ formatâ ad modum scuti. Cæterum quæ confirmant ventriculi robur sumpta & admota, vt in vomitu & lienteria, veniunt vsurpanda.

Vulgi experientia est, eboris tabella admota vētri, vōmitus compesci. Sed interim dū hæc fiunt, somnus & quies, quantum fieri potest, cōcilianda sunt. Consulendum viribus, partim odoribus, partim alimentis.

Perdulas ergò, aut iuuenes pullos columbarum confixos baculis myrthi, rubi, cinamomi, vt res exigit, conspersos interim, dū assantur, aquâ ros. vino granatorū, vino austero,



## DE FEBRIBVS

odorifero, primùm quidē calidos & plenos fumo naribus ægri admouebis. Ex eo tortiuo prælo succum inde exprimes: expressam materiam naribus ægri admouebis. Succum sorbēdum exhibebis. Dabis gelatinam cum succo granatorū destillatam, qualem in sputo sanguinis. Sunt qui bucellam panis assent, vino granatorum conspergant, edant, dein vinum vtiliter ebibant. Eundem assatum panē vino immersum, & cariophyllorum puluere aspersum, aluum sistere certo constat experimento.

Quòd si nihil continet eger, prius datâ aquâ tepidâ, Cucurbitum magnam affiges ventri, & interim dum ea cucurbitula fixa est, cibū exhibebis. Breuib. interuallis cucurbitulam figes, & refiges, & ita nutries,

ex Gal. sub finem libri de paratu facilibus.

Consensus est veterum medicorum, dropacismū impostum ventri singulare esse remedium assiduè vomentibus. Parabis dropacem ex quatuor partibus picis, & vna olei cydoniorū vnà liquatis, deinde extēsis in aluta. Postremò medicamentum calidum ventri applicabis.

Laudantur vincula articulorum, frictiones mediocres, fustus ex oleo multo, magis vbi eōuulsio est, vel imminet. Fuetur spina, muscoli conuulsi, articuli. Cucurbitulæ quóque & ventri & scapulis affigi possunt. Quòd si refrigerātur extrema, linteis calentibus inuoluenda sunt.

Si spasmus accidit, redeun-

P vj

dum ad curationem spasmi. Si  
 vrget sitis, semina cucumeris  
 in aquâ temperari debent, do-  
 nec intumeant: tum cortex ex-  
 terior detrahitur, quod est re-  
 liquum, aquâ incoquitur, aquâ  
 refrigerata bibitur. Cōtra syn-  
 copem cum aliis remediis su-  
 pradiētis, tum bucella imbuta  
 vino, admota naribus, cōtenta  
 ore vtendum est. Erasistratus  
 ex Chrysippo præceptore vi-  
 num aquâ frigidâ dilutū cho-  
 lera morbo affectis, tanquam  
 extremum remedium, com-  
 mēdat, vt vel morti proximos  
 refoueat. Idem probat Gal.  
 libell. de venæ sectione aduer-  
 sus Erasistratum.

*Trochisci Raze*

℞. Mastich. boli arm. thuris.  
 añ. ʒiij. carabe, cardamomi añ.  
 ℥ij. Caphurę, gallię moschatę,

Cariophyll. añ. gr. v. cum succo granatorum. fiant trochisci pondere ℥iiij. detur vnus, superbibatur ℥j. Succu granatorum. Iulep. granati, syrupi cydoniorum, aut similis.

*De Singultu ex Fernel. cap. 19.*

*lib. 4. Pathol.*

Singultum vel ab inanitione, vel à repletione fieri author est Hippocrates: atqui per febres auctas, easque malignas incidit, cum ferè perniciosus sit aliam causam habet, aut corrupti humoris acrimoniã, aut malignitatem ac perniciem, qualem perstilians febris exhibet. Hæc quippe vt vomitionem ac plerumque animi exolutionem, ita & dum in ventriculi tunicas altius inseritur, singultum ciet.

# DE FEBRIBVS

*Curatio singultus ex Holl. lib. 1. de  
morb. Intern. cap. 33. de Singultu.*

† Quod si materia est aliqua  
continens causa singultus, ea  
vel calida, vel frigida. Calida  
vacuetur vomitu, si fieri po-  
test, alioqui ꝑ. 4. rhabarb. vel  
tantumdem pul. hier. picræ in  
fero lactis, vino granatorū aci-  
dorum, & maturorū, aquâ en-  
diuix, decocto cicerū rubro-  
rum infunde, expressionē ex-  
hibe. Hic obseruandum est,  
leuiiores purgationes esse de-  
bere, quæ ad ventriculi affe-  
ctus accommodantur, nisi à  
toto corpore humor confluat.

Tū si pseuerauerit singultus,  
aquâ frigidâ propinetur. Sub-  
inde hæ pilulæ imperentur.

℞. Spodii, sem. endiuix, por-  
tulacæ, ligni aloes añ. ꝑj. pulpæ  
tamarindorū ʒj. rhabar. elect.

ʒij. confice cum oxycrato, aut  
vino granatorum. *Alind.*

℞. fyrupi ros. acetosi, oxyfac-  
charæ simplicis añ. ʒij. in qui-  
bus infunde summitatum ab-  
synthij ʒβ. fiat infusio in cali-  
dis cineribus, tum duobus aut  
tribus cochlearibus refrigera-  
ti remedij per interualla vta-  
tur. Vel iulapium parabitur  
eiusmodi.

℞. succi endiuiaë aut cicho-  
rij per residentiã depurati ʒiiij.  
cum sacchari violacei ʒij. fiat  
iulapiũ. Opportunus erit vsus  
elactarij triasantalini, quòd nō  
modò ventriculum confirmat  
& hepar, sed & refrigerat.

Cerati Santalini ʒiiij. cum  
oleo rosato malaxetur. Dein-  
de commisce spodij, rosarum.  
añ. ʒj. cum succo semperuiui  
agitata: inde finges duo scuta

DE FEBRIBVS

in alutâ. Alterum stomacho  
ad sternum: alterum ad duo-  
decimam & tertiamdecimam  
vertebram dorsi applicabis.

*In causa frigida.*

Vbi crassa & viscida materia,  
melicrato hyssopi, vel oxyme-  
lite simplici materiam præpa-  
rabis. Tum, vt mouebitur, per  
vomitum aut ventrem repur-  
gabis, ex hierâ picrâ dissolutâ,  
in decocto cicerû rubrorum.  
Dabis autem hieræ modum à  
semiunciâ ad vnciam. Conue-  
nit in hoc singultu acetû scyl-  
liticum, oxymel cum cinamo-  
mo aromatizatû, melicratum  
ex rebus incidētibus, hyssopo,  
thymo, pulegio, satureiâ, & si-  
milibus, maximè probant ga-  
langam.

℞. vini albi tenuis, odoriferi  
℥iij. in quo leuiter ferueat ga-

langæ ʒj. cinamomi, semi. anethi añ. ʒß. Conuenit & castoreū in vino odoro ad ʒij. Sed quia est fœdo odore, cinamomo, semine apiī temperari potest. Conueniūt & hæc, schoenanthum, Asarum, maiorana, Aristolochia, Enula, zinziber conditum, acorus conditus, diatrium pipereon, diacuminum, diagalanga, theriaca vetus: exteriūs, verò oleum de liliis, de amygdalis dulcibus. Instituitur etiam cerotum singulare in causâ frigidâ.

℞. Olei Nardini ʒj. Aloes Mastich. añ. ʒj. succi absynthij ʒij. cum cerâ fiat cerotum.

Etiam sedato singultu, atque vacuatâ materiâ, ea quæ roborant adstringendo. Fit aliquando, vt materia quædam venenosa sit, cui hoc puluere occurrunt sit.



DE FEBRIBVS

℞. Semi. anethi, cardui bened. citri añ. ʒj. melissæ, corticum citri añ. ʒß. coralli rubri, galangæ, macis, cinamomi añ. ʒß. margaritarum, fragmentorum, smaragdi añ. gr. viij, cornu cerui & vni cornis añ. gr. iij cum saccharo borraginato, & vino albo tenui odorifero, fiât lozengiæ, vel puluis.

Quod ad cucurbitulam attinet, iam vacuatâ materiâ primum scapulis, tum pectori & vmbilico, postremo vetriculo & 12. dorſi vertebrę afigi debet

Quòd si nec his quidem resistit singultus, his locis phœnigmi aptari debent. Alij in malo contumaciori imperant ellebori ʒj galangæ, cinamomi añ. ʒj. macerentur per noctem in vini maluatici ʒiij. colatura proximè. Nec omittēda ster-

nutatio, clamor &c. eiusmodi.

*De syncope ex Fernel. cap. 19.*

*lib. 4. Pothol.*

Animus in febre deficit & exoluitur modo ab eius humoris pernicie, qui venenatâ febrem inflixit, modò ab æruginosâ, aut prassina, aut atrâbile, quæ ventriculi os præcordiorumue membranas acriter ferit ac vellicat. Quum autem turgens hæc materia è venis in cordis arcem vel subit, vel impellitur, multò grauior obtingit exolutio, nec non syncope imprimis periculosa, quum ea repente & affatim irruerit. Exolutionem etiam plerumq; infert, symptomatum quæ febribus assistunt sæuitia, vt vigiliæ, dolor, timor, immodica & repête facta quæuis vacuatio, itémque victus tenuis, atque

DE FEBRIBVS

parcus. Quæ hæcenus protuli, ferè quidem ventriculi aut præcordiorû offensione emergunt, quam vel bilis acerrima, vel alius quiuis putrescens, aut venenatus humor in eas sedes vehementiùs irruit, aut eò de se tetrum vaporem effundit.

Quæ autem non ex his causis profecta sũt, ex alio quodã peculiari morbo ducũt originẽ.

*Curatio ex Holler lib. I. de morb.*

*intern. cap. 30. de syncope.*

In euacuatine, refouendæ sunt vires, pauco alimento dato interuallis, distillatis, expressionibus, gelatinâ, iusculis vino, aromaticis.

*Puluisculus cordialis.*

℞. margarit. splendorũ ʒij. rasu. eboris, ossis de corde cerui añ. ʒj. vnicornis gr. iiij. sacchari violati ʒij. vtatur medio.

cochleari cum fyrupo de acetositate citri. *Alius.*

℞. Corticis citri ʒj. margarit. splendorū. ʒij. sem. citri conditi sem. melonū, & acetosæ añ. ʒij. limaturæ auri, fragmētōrū smaragdi, hyacinthi, saphiri añ. ʒj. sacchari ros. ʒiij. misce, detur mediū cochleare cū vino albo, tenui, odorifero, & parū vinoso, diluto cū aquā, in quā aurum sæpius extinctum sit.

Exhibetur verò vinum, quòd suā substātiā spiritus, quā celerimè reparet. At aduertēdum est, ne sit aliqua viscerum inflammatio, aut delirium, aut ardor cum cruditate. Alij syrump acetositatis citri ad ʒj. cū aquæ oxalidis ʒij. dissolutum propinant.

*Trochisci calidi.*

℞. Mastichis, spicæ, ligni

# DE FEBRIBVS

aloes, cinamomi, cariophyllo-  
rum, gallæ moschatæ, nucis  
moschatæ, cubub, cardamomi  
maioris, granorum paradisi,  
corticis citri añ. ℥ij. moschi gr.  
vj. cum vino odorifero fiant  
trochisci pondere ℥j. aut ℥iij.  
Alius puluisculus ad idem.

℞. Electarij de gēmis, confe-  
ctionis alchermes, aromatici  
rosa. añ. ℥ij. macis, Cinamomi  
añ. ℥β. sacchari in aqua boragi-  
nis dissoluti, & siccati ℥iij. mi-  
sce fiat pulvis.

## *Epithema frigidum.*

℞. Aquæ destillationis rosa-  
rum violarū boraginis añ. ℥iij.  
vini tenuis & odoriferi ℥j. spe-  
cierū diamargaritarum frigi-  
darum ℥iβ. misce. Pannis pur-  
pureus his calidis imbutus,  
cordi admouendus.

## *Epithema calidum.*

℞. vini quartaria tria, melisso  
phylli. moschatae ℥iij. misce.

*Inunctiones.*

℞. olei de casto. & iasmino  
añ. ℥j. Ambrae gra. iij.

*Alia.*

℞. olei viol. ℥ij. cum duobus  
granis caphurae misce, fiat inū-  
ctio. Inūctiones, & epithema-  
ta sub sinistra mamma fiunt.

Potiones fiant in frigidâ, ex  
vino tenui, odorifero, ex syru-  
po de corticibus citri cū aquis  
melissophyll. borag. calêdulæ.

In calidâ cum syrupo de li-  
monibus, de persicis, oxysac-  
charâ simplici, syrupo aceto-  
so, violato, de acetositate citri,  
& similibus. Maximè com-  
mendatur syrupus de pomis,  
qui ita parari debet.

℞. succi pomorum odorife-  
rorum cocti & depurati lib. i.


DE FEBR. LIBELLVS.

coletur per manicam Hippocratis cum sacchari violati ℥iij. Cinamomi ℥ij. vel recētiorum more, cum aquæ portione, aut paulò minore sacchari, fiat syrupus.


Eliguntur pomâ omninò odorifera, partim acidula, partim dulciuscula. Alioqui pomatio optimo vtendum est, ex quo vel iulep, vel syrupus parari potest.


FINIS.

A 01 1460772











B-96:

xxx  
A-22